FACTORES ASOCIADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE MANEJO DE
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA EN
EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN 2014

RUBY JACKELINE REY TRIANA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA
BUCARAMANGA
2015

FACTORES ASOCIADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE MANEJO DE
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA EN
EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN 2014

RUBY JACKELINE REY TRIANA

Trabajo de grado para obtener el grado de especialista en Epidemiología

Docente Asesor:

Dr. Sergio Serrano Gómez
Docente UNAB

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA
BUCARAMANGA
2015

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Floridablanca, 07/11/2015

TABLA DE CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCION	09
1. MARCO TEÓRICO	10
1.1 Distribución y características del virus de la rabia	11
1.1. 2 Supervivencia de la Rabia: implicaciones de los casos reportados	12
1.1. 3 Tratamiento de la Rabia: estado actual y futuro	14
1.1. 4 Acciones y justificación de la vigilancia epidemiológica	15
1.1. 5 Rabia como evento de notificación obligatoria	16
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
3. OBJETIVOS	20
3.1 Objetivo general	20
3.2 Objetivos específicos	20
4. METODOLOGIA	22
5. RESULTADOS ,.....	27
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS	33
7. CONCLUSIONES	36
8.RECOMENDACIONES	37
BIBLIOGRAFÍA	38
ANEXOS	47

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Casos reportados de la supervivencia de la Rabia	Pág. 12
Tabla 2. Resumen de las variables socio demográficas	27
Tabla 3. Frecuencia por barrios casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, por comunas año 2014	29
Tabla 4. Resumen de las variables socio demográficas	30
Tabla 5. Relación de cumplimiento e incumplimiento de la guía de manejo con las demás variables que fueron significativas según ji cuadrado $>0,05$	32

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, año 2014	28
Figura 2. Distribución por régimen de Aseguramiento de casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, 2014	28
Figura 3. Frecuencia eventos de exposiciones rábicas por comuna en Bucaramanga	29
Figura 4. Distribución por antecedente de vacunación en animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, 2014	31

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Tabla operativa de las variables

Pág.
47

GLOSARIO

AGRESIÓN: Es un ataque no provocado o un acto belicoso y también la práctica o hábito de ser agresivo o belicoso. Acto de atentar contra la integridad orgánica o funcional de un órgano o una parte.

ATENCIÓN: La atención es un reflejo selectivo por que selecciona los estímulos concentrados.

EPIDEMIOLOGIA: es la disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas. Ocupa un lugar especial en la intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales y aplica los métodos y principios de estas ciencias al estudio de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas determinadas.

GUÍA: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación.

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia Epidemiológica

VIGILANCIA: Cuidado y atención exacta en las cosas de que cada uno está encargado.

VIRUS: son organismos un poco especiales. No son seres vivos porque no son capaces de realizar la mayoría de estas funciones. Sin embargo, sí son capaces de reproducirse y para ello, necesitan invadir las células de los seres vivos.

ZOONOSIS: Enfermedad de los animales que muchas veces se comunica a las personas, por ejemplo, la rabia.

INTRODUCCIÓN

La rabia es una enfermedad viral causada por un lyssavirus, el cual tiene varios reservorios silvestres y que en ocasiones puede ser transmitida al ser humano a través de la mordedura de animales siendo los canes los principales causantes de esta zoonosis. A pesar de la relativamente baja incidencia de esta enfermedad, cobra un rol representativo el hecho que la tasa de mortalidad es bastante alta y que los sobrevivientes a la misma son casos excepcionales, incluso, no hay un algoritmo de manejo estructurado y al parecer la supervivencia se relaciona con idiosincrasias inmunológicas. Desde el punto de vista de la Salud Pública, la vigilancia epidemiológica cobra un rol crítico en la eliminación de la enfermedad, política a la cual ha invitado la OMS; infortunadamente en nuestro medio se ha encontrado debilidad en la vigilancia por fenómenos como el sub reporte de casos o la muy escasa adherencia a los protocolos de manejo.

Objetivo general: Identificar los factores asociados con el incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en el año 2014. Como objetivos específicos se tiene: cuantificar el incumplimiento de la guía de manejo y las características del incumplimiento de la guía de manejo.

Métodos: Estudio descriptivo-analítico retrospectivo; estadística descriptiva y análisis a través de Stata y medidas no paramétricas: Chi cuadrado.

Resultados esperados: Al finalizar este proyecto se tendrán resultados en la generación de nuevo conocimiento sobre los factores que influyen en el adecuado cumplimiento del protocolo de la guía de manejo y la descripción socio demográfica del evento. Estos productos conforman el insumo para la generación de estrategias de ajuste en los programas de vigilancia epidemiológica de las zoonosis. En cuanto a la formación de recurso humano, se tendrá la capacitación de una especialista en Epidemiología y el insumo para generar productos publicables de literatura científica.

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Distribución y características del virus de la rabia

La rabia es una enfermedad causada por el Rhabdoviridae del género Lyssavirus. De este virus se conocen siete genotipos, de los cuales solo el número 1 se ha encontrado como patógeno. En Colombia se han logrado identificar las siguientes variantes del genotipo 1: V1: perro; V3: murciélago hematófago, V4: murciélago insectívoro, V5: vampiro y V8: zorrillo (1).

La rabia es causada por todos los miembros del género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae. Este género contiene 12 virus: el de la rabia (VRAB), virus del murciélago Lagos, virus Mokola, virus Duvenhage, Lyssavirus del murciélago europeo tipo 1 y 2 (EBLV-1 y EBLV-2), Lyssavirus del murciélago Australiano, virus Aravan, virus Khujand, virus Irkut y virus caucásico del oeste (2). Una nueva especie propuesta es el virus del murciélago de Shimoni que ha sido aislado del murciélago con nariz en forma de hoja (*Hipposideroscommersoni*)(3). Varios genotipos de Lyssavirus son reconocidos mundialmente (3,4) el virus genotipo 1, representado por el virus de la rabia serotipo 1 clásico, circula en el continente Americano (5-7)

Un estudio de cepas virales realizadas en Bolivia entre 1997 y 2001 mostró que hasta un 97% de los virus corresponden a la variante 1 (canino) (8,9). Por el contrario, en Chile (1989-2005), la cepa vírica predominante entre reservorio era la variante 4 (murciélagos) (10). Un hallazgo similar fue reportado en Costa Rica (11). Los linajes de los virus de la rabia del murciélago vampiro asociados con la variante antigénica³ se encuentran ampliamente distribuidos desde México a Sur América, sugieren estos linajes como los más probables ancestros de la rabia del murciélago vampiro y los que se han movido por las poblaciones de murciélagos vampiros en todas las Américas. Un predominio de la variante 2 del virus (asociado con los perros) se encontró en una región de Brasil, según datos obtenidos de 1997 a 2003 (12). En la Argentina (1995-2002), se detectaron cuatro variantes antigénicas, en su mayoría variantes antigénicas 1 y 3, que son ampliamente distribuidos en Latinoamérica (13). En Colombia se han reportado casos de rabia entre 1980 y 2009, algunos de ellos confirmados positivos para rabia y los otros se dedujeron por nexos epidemiológicos; se aisló la variante antigénica 3, típica de rabia transmitida por murciélago hematófago, como la única variante presente en el material encefálico de la necropsia (14-17).

La rabia se ha conocido en la humanidad desde la antigüedad, la enfermedad fue descrita por Aristóteles y marca su reconocimiento en el período greco-romano. Sin embargo, ya era conocido en la India muchos siglos anteriores, y las descripciones gráficas de hidrofobia así como de la rabia animal se encuentran en los antiguos textos védicos médicos (18). Es una encefalomiелitis aguda

rápidamente progresiva temida a través de los siglos por su extremadamente alta su tasa de letalidad, una de las más altas de cualquier enfermedad infecciosa. Ocurre en todos los continentes excepto en Antártica, la rabia es una zoonosis viral de los cuales un número de especies de carnívoros y murciélagos sirven como reservorios naturales. La enfermedad ha persistido debido a la incapacidad del hombre para eliminar los reservorios del virus que existen en tan diversos animales como perros, zorros, mapaches, zorrillos y murciélagos. Ampliamente frecuente en los países en desarrollo, la rabia se ha estimado por causar 1.1 de cada 100.000 muertes humanas en India con una subestimación bruta de la incidencia real (19). Casos autóctonos o importados de rabia humana ocurren esporádicamente en los países desarrollados. Los neurólogos, particularmente en los países en desarrollo, son probablemente los que se encontrarán con casos de encefalitis rábica especialmente atípica y la forma paralítica por muchos años venideros.

El virus produce en el hombre una encefalomielitis vírica que frecuentemente suele ser letal. Cuando la persona es infectada tiende a presentar diversidad de signos y síntomas tales como sensación de angustia, cefalea, malestar general, excitabilidad y aerofobia. Esta enfermedad al evolucionar produce paresias iniciando por los músculos de la deglución provocando hidrofobia, y esto evoluciona a parálisis de los músculos respiratorios. Adicional el paciente tiende a manifestar alucinaciones. En los países desarrollados sigue siendo más frecuente las agresiones por animales domésticos como el perro. Se ha observado que en América Central y Sur América han aumentado las agresiones por vampiro y murciélago insectívoro. (20)

A pesar del aumento en nuestra comprensión de la patogénesis de la rabia sigue siendo una enfermedad letal, siendo considerado invariablemente fatal una vez que aparecen los síntomas neurológicos, ya sea furiosa o de tipo paralítica (21). Sin embargo, el concepto de larga data que la rabia es una infección letal en los seres humanos una vez que el virus causante alcanza el sistema nervioso central (SNC) ha sido puesta en duda por la reciente supervivencia de algunos de los pacientes con rabia clínicamente manifiesta. Desde 1972, al menos diez pacientes fueron reportados por haber sobrevivido a la encefalitis rábica con diversos grados de secuelas neurológicas (22–24). Esta cifra tiene que ser contrastada con los cerca de 60,000 muertes por rabia que ocurren en todo el mundo cada año, principalmente en Asia y África, con 30,000 muertes en India y 16,000 en África. Las razones por las que esta pequeña minoría sobrevivió a la enfermedad aguda son un tema de debate. El undécimo caso documentado de supervivencia de rabia, que se desarrolló después de haber sido mordido por un perro callejero, aunque con secuelas neurológicas graves (21). Al igual que en los pacientes en los informes anteriores, este hombre demostró una fuerte respuesta inmune como indicó la eliminación viral periférica y los títulos muy altos en suero y de los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, la eliminación del virus, mediado inmunológicamente parece ser un requisito previo para la supervivencia.

Este trabajo concluye que los supervivientes excepcionales demuestran que el virus puede ser efectivamente eliminado del sistema nervioso central (SNC) humano, de acuerdo con el trabajo en modelos animales tanto caninos como de murciélagos. También proponen estrategias de tratamiento eficaces probables como terapia de combinación que incorpora la modulación inmunológica con alguna forma de quimioterapia.

1.1.2 Supervivencia de la Rabia: implicaciones de los casos reportados

De Souza y Madhusudana 2014 presentaron el análisis de los casos reportados de la supervivencia de la rabia (Tabla 1).

Tabla 1. Casos reportados de la supervivencia de la Rabia

No.	Ref.	Year	Age, Sex	Mode of infection	Immunisation	Antibody detection	Virus or antigen isolation	Outcome
1	Present case	2013	17, M	Dog bite	PCEC, hRIG	Serum 1:130,000, CSF >1:8000	–	Severe sequelae
2	^a	2013	25, M	Dog bite	One dose of cell culture vaccine ^b	Serum 70 IU/mL, CSF 35 IU/mL	–	Good recovery
3	20	2013	17, M	Dog bite	One dose Vero cell vaccine ^c	Serum 1:3788	Viral RNA + by PCR in serum and saliva, corneal FAT positive	Complete recovery
4	17	2012	8, F	Presumed cat scratch	None	Serum 1:160, CSF 1:8	–	Mild sequelae
5	16	2010	17, F	Bat scratches	None ^d	Serum 1:8192, CSF 1:32	–	Persistent headache, no deficits
6	19	2008	15, M	Bat bites	Tissue culture vaccine, no hRIG	Serum and CSF >100 IU/mL	Viral RNA + by PCR on hair follicles	Moderate sequelae
7	8	2005	15, F	Bat bite	None	Serum 1:32,768, CSF 1:2048	–	Mild sequelae
8	18	2002	6, F	Dog bite	PCEC, no hRIG	Serum 1:312,000, CSF 1:182,000	–	Severe sequelae
9	15	1994	9, M	Dog bite	Vero cell + human diploid cell vaccine, no hRIG	Serum 1:34,800, CSF 1:78,125	–	Severe sequelae
10	13	1977	32, M	Laboratory exposure to virus aerosol	Pre-exposure prophylaxis with duck embryo vaccine	Serum 1:32 measured two months before exposure	?	Severe sequelae
11	14	1976	45, F	Dog bite	Suckling mouse brain vaccine, no hRIG	Serum 1:640,000, CSF 1:160,000	–	"Nearly complete" recovery
12	12	1972	6, M	Bat bite	Duck embryo vaccine, no hRIG	Serum 1:63,000	Isolated from bat	Complete recovery

Fuente: De Souza, A., & Madhusudana, S. N. (2014). Survival from rabies encephalitis. *Journal of the Neurological Sciences*, 339(1-2), 8–14. doi:10.1016/j.jns.2014.02.013

M; masculino; F: hembra; PCEC: cultivo de células de embrión de pollo purificado; hRIG: inmunoglobulina antirrábica humana; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; FAT: técnica de anticuerpos fluorescentes.

^a Profesor S Galvez, comunicación personal.

^b Recibido sólo una dosis de la vacuna de células Vero antes de la aparición de los síntomas.

^cRecibió sólo una dosis de la vacuna de células Vero antes de la aparición de los síntomas. Ciclo completo de la vacunación después de la aparición de los síntomas, junto con 40 IU / kg RIG equina.

^dRecibió ninguna vacuna antes de la aparición de los síntomas neurológicos. Una dosis de vacuna y 1.500 IU de HRIG da 19 días después de que ella se convirtió en un síntoma

De los doce supervivientes de la rabia reportados hasta la fecha siete habían recibido bien la profilaxis pre-exposición (un caso) o la profilaxis post-exposición (PEP). Aparte del paciente descrito por de Souza y Madhusudana (2014), ninguno había recibido inmunoglobulina antirrábica humana hRIG. A un paciente se le dio una sola dosis de vacuna y la inmunoglobulina antirrábica humana después de que ella se convirtió en sintomática y se confirmó el diagnóstico de rabia. Dos pacientes recibieron una sola dosis de la vacuna antes de los síntomas clínicos desarrollados. Ninguno de estos pacientes mostró los signos clásicos de la rabia furiosa, aunque todos menos uno requirió de cuidados intensivos y una proporción significativa (4 de 12) quedaron con graves secuelas neurológicas. De los ocho con leve a moderada residual, cinco no habían recibido la vacuna. Diez de 12 pacientes, incluyendo los cuatro que no recibieron PEP manifestaron una respuesta inmune robusta con altos títulos de anticuerpos en el suero y en el fluido cerebro espinal (CSF), y el virus de la rabia RNA fue detectable en sólo dos pacientes. Esto está en contraste con el escenario habitual en la rabia canina donde <19% de los pacientes tienen anticuerpos demostrables en el suero y los anticuerpos neutralizantes están ausentes en CSF, lo que sugiere que el sistema inmune falla para reconocer la infección y producir anticuerpos neutralizantes (21)

La eliminación del virus mediada inmunológicamente parece ser un requisito previo para la supervivencia, como se ve en los pacientes representados en la Tabla 1, así como los estudios en animales (25,26). Un paralelo puede ser dibujado con la rabia paralítica, donde se asocia una mejor respuesta inmune y la carga viral más baja con una supervivencia más larga que la forma furiosa (27). Un paciente fue juzgado ser un caso de infección humana abortiva, el único reportado hasta la fecha (28). Inusualmente, ella tenía un título CSF bajo de anticuerpos. Los títulos bajos de anticuerpos específicos-rabia también fueron vistos en otro sobreviviente, que no desarrolló anticuerpos neutralizantes (29). Estos pacientes pueden haber tenido infección con un isotipo viral menos virulento, o podría haber manifestado menor estimulación inmune aparente debido a las diferencias innatas en la función del sistema inmunológico.

Sólo recientemente se han considerado los ensayos de anticuerpos por el potencial para evaluar posibilidades de recuperación, en particular cuando el ARN viral no es detectado (23,29). La presencia de anticuerpos neutralizante contra el virus de la rabia en la presentación clínica es probablemente un hallazgo de laboratorio favorable, lo que indica que la respuesta inmune puede reemplazar la muerte de los pacientes (30,31). Las pruebas negativas de detección del antígeno del

virus de la rabia o ARN son probablemente también favorable, ya que pueden reflejar un bloqueo de la diseminación centrífuga del virus o eliminación viral eficaz por parte del sistema inmunológico (32). Así los pacientes pueden tener mejores resultados de cuidados intensivos (21). El Protocolo de Milwaukee se utilizó en cuatro de los doce pacientes en la Tabla 1 (casos 2, 4, 6 y 7). Dos no habían sido vacunados, uno había recibido sólo una única dosis de la vacuna, y tres pacientes (incluyendo el caso 6 que recibió un ciclo completo de PEP) tuvieron respuestas inmunitarias robustas con altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Los cuatro sobrevivientes fueron reportados al tener un resultado neurológico favorable. De los tres sobrevivientes contemporáneos que no recibieron este tratamiento, uno tenía un mal resultado (caso 1).

Ya que el antígeno viral o el ARN no fueron detectables en la mayoría de los supervivientes, se ha planteado la posibilidad de que ellos en realidad tienen encefalomielitis post-vacuna en lugar de rabia (33). Los títulos extremadamente altos de anticuerpos tanto en suero y CSF con la demostración de la síntesis anticuerpos intratecales (22,34,35) argumentan en contra de esto. Los virus que infectan a estos los pacientes pueden haber sido biológicamente atenuados, o tienen tropismo celular diferente. Como los virus no se aislaron de la mayoría de los supervivientes, esto sigue siendo conjetura. Los factores del huésped pueden afectar a la propagación del virus, lo que resulta en un mayor resultado favorable. Los estudios de laboratorio también sugieren que la dosis de virus inoculado y la vía de administración desempeñan papeles importantes en el resultado (36).

1.1.3 Tratamiento de la Rabia: estado actual y futuro

Los informes procedentes de Tailandia e India sugieren que después de la aparición de los síntomas de trastornos neurológicos en pacientes con rabia canina, la supervivencia fue de aproximadamente de 5-11 días (37,38). La supervivencia se puede extender a 1 mes o mayor en los pacientes que recibieron el apoyo de cuidados intensivos (39,40). Una vez que los pacientes han desarrollado rabia clínica de la que actualmente no hay un tratamiento eficaz disponible, y las perspectivas para las personas infectadas que no reciben profilaxis post-exposición (PEP) antes del desarrollo de los primeros signos de la enfermedad son deprimentes. PEP es eficaz sólo antes del desarrollo del síndrome clínico, lo que sugiere que funciona mediante la prevención de la propagación del virus en el SNC (22,41,42). Así hRIG se utiliza para proporcionar protección provisional hasta que la producción activa de anticuerpos de 7-14 días después de la vacunación. La hRIG no se utiliza por más de 7 días después de comenzar la vacunación ya que se asume haber iniciado una respuesta inmune protectora (9).

1.1.4 Acciones y justificación de la vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es uno de los pilares de los programas de control de enfermedades, a pesar de ello, en los países en vías de desarrollo es usual que existan carencias de infraestructura dedicada a estos programas, destacándose las zoonosis que tienen la particularidad de necesitar una concatenación de acciones colaborativas desde la Medicina Veterinaria y la Medicina Humana (43,44). La vigilancia es un elemento crítico en el control y erradicación de enfermedades infecciosas, permite la detección y reporte temprano de los casos, que es vital para iniciar respuestas tempranas y permite tomar decisiones informadas respecto a los puntos críticos donde debe intensificarse los esfuerzos del equipo. Por otra parte, ayuda a generar datos de costo – efectividad y avance de las intervenciones cuando ya estas se han puesto en marcha y así apuntar hacia la sostenibilidad de las mismas. Cuando ya se logra la eliminación de una zoonosis, la vigilancia se torna aún más crítica con el propósito de detectar nuevas incursiones o brotes. Como manifestaba Henderson, no hay chance alguno de que exista un programa exitoso de erradicación si no se desarrolla un programa efectivo de reporte y vigilancia (45).

La rabia es una de las zoonosis más temidas debido a que casi siempre que se presenta su desenlace es una encefalitis aguda y letal; si bien es cierto que muchas especies pueden albergar el virus de la rabia haciendo casi imposible su erradicación, los cánidos son la principal fuente de contagio para el hombre y una especie en la cual puede establecerse un control adecuado (27,46).

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha determinado que la rabia canina puede erradicarse en el largo plazo a través de acciones como campañas de vacunación a gran escala que han permitido a algunos países eliminar la rabia en los canes (47); sin embargo, la vigilancia epidemiológica efectiva y contundente es piedra angular para lograr el éxito en los programas de eliminación de rabia canina puesto que los tiempos de respuesta dependen de la premura con que se detecte el caso índice y así organizar una rápida respuesta frente al brote, además que se encarga de monitorear el impacto de las intervenciones (48).

Se ha evidenciado una reemergencia de la rabia en zonas que anteriormente eran libres de la enfermedad (49–51) junto al mayor énfasis en la existencia de programas dirigidos a la eliminación de la misma, pero no hay que desconocer que la incidencia de la enfermedad es baja y si se siguen las guías de la OMS que recomiendan hacer muestreo de 0.01% a 0.02% de la población canina puede ser una muestra insuficiente para asegurar la efectividad de la vigilancia epidemiológica porque pueden no salir suficientes muestras positivas incluso en zonas endémicas; es por esto que actualmente se recomienda hacer la vigilancia epidemiológica enfocada en animales de alto riesgo (por ejemplo, los que están mordiendo sin motivo aparente, los de comportamiento extraño, los que tienen

hallazgos clínicos o son hallados muertos) además la caracterización rutinaria por virus aislados en los brotes y casos junto a datos que ayuden a identificar el origen del animal hospedero, sus fuentes de infección y origen geográfico; en forma concomitante, debe registrarse y reportarse las cifras de casos con animales sospechosos y probables, las mordeduras por animales y las personas que están en la búsqueda o recibiendo profilaxis post-exposición. Por el contrario, no se recomienda la medición de anticuerpos específicos para rabia como una medida rutinaria (52).

Otro de los problemas del control de la rabia en países en desarrollo se relaciona con el subreporte de eventos, y esto es más frecuente en el caso de las zoonosis sumado a una vigilancia débil siendo este último factor un limitante en el adecuado dimensionamiento del problema de salud pública y esto genera un importante reto para la salud pública. En áreas endémicas, las acciones de vigilancia incluyen por lo general el reporte de casos clínicamente sospechosos en humanos o animales, y de forma ideal aunque no siempre se hace, el análisis paraclínico del animal sospechoso más aún si ha generado exposición en humanos (53).

A pesar de que la vigilancia es un componente fundamental de los programas de control, a menudo no se le reconoce adecuadamente en los países en desarrollo, los cuales poseen mayor prevalencia de rabia sumado a las carencias como pobre infraestructura y escasos recursos médicos y veterinarios. Es precisamente en estos países en desarrollo, por ejemplo Colombia, en donde permanece la rabia canina como enfermedad prevalente y en ellos la vigilancia epidemiológica se hace necesaria para monitorear el impacto de cualquier esfuerzo para controlarla; teniendo en cuenta estos retos de la vigilancia epidemiológica y el propósito en crescendo para erradicar la rabia canina es que se hace necesario estudiar las diferentes acciones al respecto desde los indicadores de vigilancia.

1.1.5 Rabia como evento de notificación obligatoria

La rabia es considerada dentro del programa de vigilancia epidemiológica como uno de los eventos de notificación obligatoria que debe ser reportado semanalmente. Este evento es reportado de forma inmediata en sospecha de caso de rabia humana, teniendo en cuenta la definición de caso descrita en el protocolo de rabia. El reporte de estos eventos se hace a través del aplicativo SIVIGILA el cual es actualizado constantemente.

Dentro de la información que es reportada a la secretaria municipal de parte de las unidades primarias generadoras de datos UPGD, se manejan diversas variables que buscan reunir la información de forma completa tanto del paciente como del evento. El cumplimiento de la guía se refleja en el diligenciamiento completo de

estas variables y del seguimiento que se haga tanto al paciente como al animal agresor.

Para lograr una buena notificación es importante que las instituciones conozcan y manejen muy bien la guía con el fin de lograr obtener la información demográfica, antecedentes personales, de los animales, así como poder hacer una correcta clasificación del evento que permita aplicar el tratamiento correcto según el tipo de exposición que sufrió el paciente y del animal que causó la agresión. Este evento cuenta al igual que los demás con un periodo de cuatro semanas para realizar ajuste que en este caso corresponden al ingreso de las fechas de vacunación y aplicación de suero antirrábico.

El sistema de vigilancia y control en salud pública en el protocolo de rabia comprende como objetivo general:

“Realizar el seguimiento continuo y sistemático para la vigilancia de la rabia mediante el proceso de notificación, recolección y análisis de los datos con el fin de generar información oportuna válida y confiable que permita evaluar el comportamiento de la rabia en humanos y animales (perros y gatos), facilitando la toma de decisiones frente a la prevención y eliminación de este evento en el país”(1)

Dentro de los objetivos específicos se busca además de la recolección de la información, generar información descriptiva que permita caracterizar el comportamiento del evento, con el fin de orientar acciones oportunas en el manejo de esta zoonosis.

Es de notorio interés para realizar una vigilancia epidemiológica eficaz, la determinación del grado de conocimiento que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud para lograr los objetivos propuestos dentro de la guía de manejo: adecuada clasificación del evento (especie y características del animal agresor, circunstancias en que ocurrió la agresión: provocadas o no, estado de vacunación del animal mordedor, estado de vacunación de la persona y localización anatómica y tipo de agresión), detección temprana de brotes, detección y localización de zonas de mayor incidencia de eventos, y finalmente, adecuado manejo de las exposiciones y su correspondiente tratamiento. Todos estos factores mencionados pueden estar contribuyendo en mayor o menor grado con el incumplimiento de la guía de manejo, y a partir de esto surge interés en estudiar el fenómeno para poder detectar aquellos que tienen clara relación de asociación con el incumplimiento que amenaza la eficacia de la vigilancia epidemiológica (1).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La rabia es una enfermedad que ha sido de interés público a nivel mundial desde hace mucho tiempo. El plan de acción para la prevención y el control de la rabia urbana de las principales ciudades de las Américas es un plan que viene estando vigente desde 1983. En el 2005 se da continuidad a este plan con la etapa 5: plan de acción para la prevención y el control de la rabia en las Américas, con el fin de poder analizar cuanto se ha avanzado y que se debe fortalecer. Desde esta época se ha presentado una disminución del 90% de los casos de rabia humana transmitidos por caninos, más no deja de ser un evento de interés debido a que siguen existiendo factores que pueden hacer que esta cifra descienda considerablemente. Dentro de los factores se encuentran: la presencia de brotes de rabia transmitida por vampiros, aumento de áreas con transmisión de rabia canina, no disponibilidad de tratamiento tanto vacunas como inmunoglobulina, y la que es nuestro interés en el estudio la falta de capacidad de acción en el nivel local (54).

Diversos países al momento han logrado eliminar la rabia en humanos transmitida por perro, dentro de estos se pueden mencionar: Australia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido. Latinoamérica, así como Asia y África actualmente son las regiones con mayor riesgo de contraer rabia transmitida tanto por animales silvestres como domésticos (55).

Hacia la década de los 70s, morían de rabia al año en promedio 200 personas. En la década de los 90s se encontró una disminución en casos de rabia animal en caninos y se observó un aumento en casos de rabia en animal silvestre, siendo predominante el murciélago vampiro. Este comportamiento se ha mantenido estable hasta el día de hoy. En los años de 2000 a 2012 se han presentado en total en Colombia 35 casos de rabia en humanos, 5 causados por perro y los otros 30 por animales silvestres. De estos 35 casos cabe mencionar la presencia de dos brotes importantes, el primero en 1996 en chocó con 3 niños, y en el segundo en el 2004 con 17 eventos de rabia en la región de Bajo Baudó y pie de Pato todos por animal silvestre.

En Santander no se han presentado casos de rabia humana ocasionados por perros, pero si se han reportado casos de rabia humana por animal silvestre: murciélago hematófago, tres por animal silvestre (2 en 2010 por murciélago hematófago y 1 en 2009 por no hematófago), y un evento en 2010 por gato; las variantes identificados de 2010 a 2012 en Santander fueron la V3 y la V5. Dentro de los municipios donde se han presentado eventos de rabia desde 1983 en Santander se encuentra: Floridablanca, Barrancabermeja, Piedecuesta, Bucaramanga, Enciso, Socorro, San Gil, San Vicente y Puerto Wilches (56). Uno de los casos más infrecuentes sucedió en el municipio de Floridablanca en zona urbana, donde un joven de 15 años fue mordido por un murciélago en mano

derecha, el cual presentó sintomatología a los 4 meses de haber sufrido la agresión. Llama la atención del caso que la familia no consultó nunca al servicio de urgencias por la mordedura lo cual sugeriría un desconocimiento de la gravedad y el manejo de estos eventos (17).

Estas cifras y estos datos del caso de rabia son muestra de la gravedad y letalidad de una enfermedad que es prevenible, donde la asistencia a los servicios de salud de parte de la comunidad en caso de agresión por un animal trasmisor de rabia debe ser inmediata, donde los servicios deben conocer que este evento es de atención urgente y donde la entrevista al paciente es esencial para detectar un posible caso de rabia y donde el tratamiento debe ser administrado a tiempo.

Dada la letalidad de la enfermedad por rabia y el compromiso internacional para contener la enfermedad se construyó un protocolo cuyo objetivo es generar un proceso sistemático de observación, identificación y manejo de las exposiciones rábicas en los seres humanos orientados a diagnosticar y tratar oportunamente los casos de exposición y evitar así la aparición del caso de enfermedad por rabia (urbana o silvestre). Estas acciones protocolizadas en la guía han mostrado disminuir exitosamente el número de caso de enfermedad por rabia humana transmitida por animales potencialmente transmisores de rabia, es por ello que si no hay adherencia a la guía por parte del equipo de salud pondría en riesgo a la población urbana y rural de padecer esta enfermedad.

Este protocolo comprende el diligenciamiento de la ficha epidemiológica que captura la información de la atención brindada al paciente por las IPS o UPGD. Esta información además de ser manual, es ingresada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

El SIVIGILA se estableció por el ministerio en el año de 2006 a través del decreto 3518 de este mismo año donde enuncia:

“crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva” (57).

El conocer el incumplimiento al protocolo y comprender el porqué no se cumple, permite buscar e identificar patrones de riesgo de no cumplimiento que sean detectables tempranamente por las IPS y a su vez por las instituciones de Vigilancia en Salud pública con el fin de que no se sigan presentando y prevenir la aparición de un caso de enfermedad por rabia para estableciendo acciones tempranas post evento. Es por esto que se justifica investigar el fenómeno con la

intención de encontrar asociaciones de factores de riesgo que sean prevalentes para el no cumplimiento de la guía tales como la clasificación del evento, condición del animal agresor, localización de la lesión, especie y características del animal agresor, circunstancia en que ocurrió la lesión y el estado de vacunación del animal mordedor y de la persona antes que aparezca un caso de enfermedad, de forma que puedan establecerse intervenciones tempranas que permitan atenuar el fenómeno y ejercer una prevención efectiva antes del evento.

Debido a la gran cantidad de enfermedades nuevas que han venido apareciendo con el tiempo y se han vuelto prioridad sanitaria, de cierta forma se ha presentado un desinterés y una disminución de recursos hacia el evento de rabia. Uno de los aspectos donde se refleja este desinterés es en la gestión de los biológicos e inmunoglobulinas tanto en uso de humanos como en población animal, los cuales son indispensables en el manejo y erradicación de esta enfermedad (58).

A través del análisis de la información administrada por el SIVIGILA se puede identificar que tanto se cumple con el seguimiento de los biológicos e inmunoglobulinas y si estos tienen relación con el cumplimiento o no de la guía de rabia.

En virtud de lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles factores están asociados al incumplimiento del protocolo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en 2014?

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores asociados con el incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en 2014.

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Cuantificar el incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en 2014.
- Describir las características del incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en 2014.

4. METODOLOGÍA

a. TIPO DE ESTUDIO

Estudio transversal o de prevalencia. Este tipo de estudio permite recoger información y describir la distribución de las frecuencias de las características del cumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, así como la asociación de ésta con las variables que se quieran estudiar (59).

Los estudios transversales permiten determinar cual grupo presenta o experimenta el comportamiento de interés que se quiere estudiar, también se puede identificar los grupos que pueden tener mayor riesgo de adquirir una condición de salud. En los estudios transversales “se puede identificar no sólo el porcentaje del fenómeno o evento (número de casos), sino también identificar factores relacionados para establecer asociaciones de causalidad (un factor de riesgo y un efecto)” (60).

Este tipo de estudios permiten hacer una observación en una sola oportunidad y en un punto del tiempo tal como una fotografía instantánea, ya que la unidad de estudio no es seguida en el tiempo.

El análisis de este tipo de estudio busca inferir o relacionar las variables independientes (factores determinantes del cumplimiento de la guía de rabia), sobre la dependiente (cumplimiento de la guía de rabia) sin realizar diseño experimental.

El paradigma de este estudio es prospectivo, con una probabilidad de ocurrencia del evento dependiente de las covariables (61).

En este estudio, cada sujeto ingresa a ella en un momento determinado, está en riesgo por un tiempo, y presenta o no el desenlace (cumplimiento de la guía).

El diseño del estudio parte de una metodología retrospectiva donde se tomó la cohorte de 2014.

b. TAMAÑO DE POBLACIÓN Y MUESTRA

Para este estudio se tomó como población universo un total de 1176 eventos. Aquellos casos que no se reportaron no se tomaron en cuenta.

El objetivo de la evaluación es identificar los factores asociados con el incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.

La habilidad para identificar dichos factores se expresará con un nivel de confianza del 95%.

c. HIPÓTESIS

Ho: los factores de exposición evaluados no están asociados con el incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en 2014.

Hi: los factores de exposición evaluados sí están asociados con el incumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga en 2014.

d. DEFINICIÓN DE CASO

Sujeto expuesto a un animal potencialmente transmisor de rabia en quien se haya cumplido en su totalidad el manejo clínico del paciente que es agredido por animales potencialmente transmisores de rabia.

e. VARIABLE DEPENDIENTE

Cumplimiento de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Valores: Sí o No.

Esta variable se construye por la clasificación correcta del evento y el manejo médico que se le haya dado a cada caso y el tratamiento que se haya enviado. El manejo médico del evento comprende: clasificación del evento, localización anatómica, ubicación del animal, orden de sutura, suero y vacuna antirrábica.

Los ajustes los realizan los referentes en la Secretaría de Salud Municipal que se encargan de completar la información de la ficha epidemiológica al acudir a la fuente base de los datos (UPGD, unidad primaria generadora de datos) donde se atendió el evento en primera instancia, y a los pacientes. Por lo tanto, la variable dependiente se construye con la correcta clasificación del evento y el adecuado tratamiento y seguimiento del mismo.

f. VARIABLES DE RELACIÓN

Se describirán las covariables con los métodos estadísticos apropiados según su naturaleza y distribución (ver cuadro operativo de variables). Se explorará la

relación de dependencia entre la variable dependiente y las independientes en busca de asociaciones. Se considerará un valor de p menor a 0.05 como significativos.

g. CONTROL DE SESGOS

El sesgo que se podría presentar con mayor frecuencia en este tipo de estudio y en este en especial podría ser el sesgo de información, ya que al momento de descargar la información del SIVIGILA no refleja los ajustes que han sido realizados por las UPGD del municipio de Bucaramanga. Una forma de evitar este sesgo es comparando con los informes mensuales que son entregados por las UPGD al referente del programa.

Sesgo de selección: todos los sujetos que ingresaron a la cohorte tuvieron las mismas oportunidades para ingresar a la misma (agresión por animal potencialmente transmisor de rabia) y en cuanto a las exposiciones y el evento de interés. Se utilizarán los casos incidentes en lugar de prevalentes para evitarlo.

h. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recolectó la información mediante base de datos de la Secretaría de Salud Municipal, por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA). Selección de los 1176 pacientes de Bucaramanga y notificados a la secretaria de salud.

i. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Cuando una persona es agredida por un animal potencialmente transmisor de rabia y consulta a una UPGD inicia el proceso de vigilancia epidemiológica a través del SIVIGILA. Esta información es generada por las UPGDs correspondientes al municipio de Bucaramanga de forma semanal y es consolidada por el grupo de vigilancia epidemiológica específicamente por la referente municipal encargada del programa de zoonosis desde el municipio.

Los datos son adquiridos por la coordinación del programa de vigilancia epidemiológica a través de una base de datos en Excel generada por el SIVIGILA que contiene cada una de las variables a analizar, las cuales se describen detalladamente al final del estudio en el cuadro de variables. La información fue dada por la enfermera Blanca Gómez de la Secretaría de Salud Municipal de Bucaramanga.

j. PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Se codificó y sistematizó la información obtenida mediante las bases de datos realizadas en Excel. Se controlaron los datos procurando que sean confiables.

k. PLAN DE ANALISIS DE DATOS

Se seleccionaron las variables descriptivas demográficas, de tiempo y de ubicación geográfica que estaban presentes. Para la descripción de la información para las variables continuas se calcularán distribuciones de frecuencia y para las variables discretas medidas de resumen (promedio y desviación estándar) y medidas de posición (mediana), según el tipo de variable. Para evaluar la calidad de los datos, crear nuevas variables, recategorizarlas y hacer los ajustes correspondientes, se utilizarán los programas de Microsoft Excel. El procesamiento estadístico se hará con el software Stata®. La delimitación, abordaje y análisis se realizará de acuerdo al manejo médico del evento que comprende las variables: clasificación del evento, localización anatómica de la agresión, ubicación animal, orden de sutura, orden de suero y orden de vacuna antirrábica. Este análisis se hizo a través de medidas no paramétricas: Chi cuadrado.

l. DISPOSICIONES VIGENTES

Este proyecto emplea un método de investigación documental retrospectivo, que involucra únicamente la recopilación y revisión de la información del evento agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia del municipio de Bucaramanga. Los datos de los participantes serán tratados con absoluta confidencialidad. No se pretende realizar ningún tipo de intervención que atente contra la salud o el bienestar físico o mental de los pacientes, ni va en contra de la equidad; por todo esto no se considera necesario obtener el consentimiento Informado escrito por parte de los participantes.

m. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Esta investigación se considera sin riesgo y será realizada siguiendo las normas establecidas en la Declaración de Helsinki (62) y las normas del Ministerio de la Protección Social de Colombia, artículo 11 de la resolución N° 0008430 de 1993 (63) en el artículo 11 de la misma en la cual se exige el respeto de los derechos y

la dignidad de los participantes en investigación médica, sin manipulación o alteración de la información en el manejo de las historias clínicas. y en la Ley 84 de 1989 (64) que establece la protección a los animales. Esta investigación respeta los principios éticos generales establecidos en la declaración CIOMS de 2002 (Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos) (65) como son el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia pues protege la información de las personas (confidencialidad) contra daño o abuso; los resultados de esta investigación proveerán información que beneficie a los pacientes actuales y futuros en cuanto la atención de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia; y, finalmente, todos los datos de los sujetos pertenecientes a la cohorte previamente descrita serán analizados en forma correcta y apropiada, sin protección de intereses propios por parte de los investigadores. Esta investigación responde a la necesidad pertinente y urgente de proveer una atención oportuna y adecuada en el caso de una agresión por animales potencialmente transmisores de rabia en el área metropolitana de Bucaramanga dado el desenlace potencialmente fatal de una falla en el protocolo.

Este proyecto emplea un método de investigación documental retrospectivo, que involucra únicamente la recopilación y revisión de la información del evento agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia del municipio de Bucaramanga. Los datos de los participantes serán tratados con absoluta confidencialidad. No se pretende realizar ningún tipo de intervención que atente contra la salud o el bienestar físico o mental de los pacientes, ni va en contra de la equidad; por todo esto, no se considera necesario obtener el consentimiento informado escrito por parte de los participantes, según lo permitido por el parágrafo primero del artículo 16 de la resolución N° 0008430 de 1993 (63).

El nombre e identificación de los sujetos de la cohorte sólo será conocido por el especialista adscrito al proyecto que maneja el registro de la información colectada en la base de datos. Los resultados que se generen de esta investigación serán publicados en revistas especializadas de circulación nacional o internacional, y se garantiza la confidencialidad de la identidad de los pacientes en dichos documentos. No existen estímulos económicos u otras motivaciones especiales por parte del equipo investigador.

Los datos serán obtenidos de las bases recopiladas por el SIVIGILA por lo cual no se diseñará un instrumento de recolección de datos.

5. RESULTADOS

Dentro de los 1176 eventos correspondientes a Bucaramanga, el promedio de edad de la población afectada fue 29,5 años (Tabla 2) y en los rangos etarios acorde al ciclo vital, la población mayormente afectada correspondió a quienes se hayan entre 26 y 59 años (31,2%), seguido por quienes están entre 5 y 12 años (20%) y los menores de 5 años (14%).

Al analizar la población según el sexo se encontró que el evento se presentó con mayor frecuencia en varones (51%). El área con mayor ocurrencia de eventos fue la cabecera municipal (93%), seguida del centro poblado (6%) y rural disperso (1%).

Tabla 2. Resumen de las variables socio demográficas

Parámetro	Promedio	EE	IC95%	
Edad	29,48554	0,6784665	28,1544	30,81669
Edad por Rangos				
0 a 5 años	0,1394558	0,0101062	0,1207825	0,160489
5 a 12 años	0,204932	0,0117757	0,1827916	0,2290026
12 a 18 años	0,0748299	0,0076759	0,0610944	0,091353
18 a 26 años	0,1267007	0,009704	0,108852	0,1469933
26 a 59 años	0,3120748	0,013517	0,2861885	0,33919
mayor a 59 años	0,1420068	0,010183	0,1231754	0,1631813
Sexo				
masculino	0,5119048	0,0145824	0,4832866	0,5404451
Femenino	0,4880952	0,0145824	0,4595549	0,5167134
Área				
Cabecera Municipal	0,9251701	0,0076759	0,908647	0,9389056
Centro Poblado	0,0612245	0,006994	0,0488567	0,0764714
Rural disperso	0,0136054	0,0033796	0,0083454	0,0221069
Aseguramiento				
Contributivo	0,5612245	0,0144767	0,5326513	0,5893974
Subsidiado	0,3018707	0,0133924	0,2762608	0,3287763
No asegurado	0,0535714	0,0065689	0,0420525	0,0680216
Especial	0,0493197	0,006317	0,0383025	0,0632974
Excepción	0,0340136	0,005288	0,0250343	0,0460614

Fuente: SIVIGILA Bucaramanga 2014

La notificación fue constante durante todas las semanas epidemiológicas como se puede evidenciar en el gráfico.

Gráfica 1. Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, año 2014

Fuente: SIVIGLA, Bucaramanga, 2014

La población más afectada por régimen de aseguramiento fue la contributiva (56%), seguida de la subsidiada (30%) y población no asegurada (5%). Ver gráfica

Gráfica 2. Distribución por régimen de Aseguramiento de casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, 2014

Fuente: SIVIGLA, Bucaramanga, 2014

Al evaluar la ocurrencia de eventos de exposición rábica en cada una de las 17 comunas de Bucaramanga se encontró que las de mayor incidencia fueron la comuna 1 (11,67%), la 3 (9,21%), la 4 y 13 (7,89%).

Gráfico 3. Frecuencia eventos de exposiciones rábicas por comuna en Bucaramanga

Fuente: SIVIGILA Bucaramanga 2014

Adicional se revisaron los barrios con mayor frecuencia de casos de las tres comunas más afectadas.

Tabla 3. Frecuencia por barrios casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, por comunas año 2014

COMUNA	BARRIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Villa Rosa	19	14%
1	Kennedy	17	13%
1	Café Madrid	15	11%
1	Colorados	8	6%
3	San francisco	32	30%
3	Comuneros	24	23%
3	Universidad	9	9%
13	Álvarez	13	14%
13	San Alonso	10	11%
13	Sin información	30	33%

Fuente: SIVIGLA, Bucaramanga, 2014

Tabla 4. Resumen de las variables socio demográficas

Parámetro	Promedio	EE	IC95%	
Tipo de agresión				
Mordedura	0,8818027	0,0094183	0,8620381	0,8990674
Arañazo	0,1156463	0,0093295	0,0985626	0,1352467
Lamedura mucosas y piel lesionada	0,0008503	0,0008503	0,0001194	0,0060276
Contacto de saliva piel lesionada	0,0008503	0,0008503	0,0001194	0,0060276
Otro	0,0008503	0,0008503	0,0001194	0,0060276
Número de lesiones				
Única	0,6352041	0,0140431	0,6072351	0,6622891
Múltiple	0,3647959	0,0140431	0,3377109	0,3927649
Carnet de vacunas				
Sí	0,1733102	0,0111473	0,1525164	0,1962825
No	0,8266898	0,0111473	0,8037175	0,8474836
Ubicación del Animal				
Observable	0,7625216	0,0125104	0,7371106	0,7861888
Perdido	0,2305699	0,0123828	0,2071745	0,2557551
Muerto	0,0069085	0,0024351	0,003455	0,013766
Tipo de Exposición				
No exposición	0,7542517	0,0125599	0,7287862	0,7780543
Exposición leve	0,1692177	0,0109382	0,1488263	0,1917735
Exposición grave	0,0765306	0,0077555	0,062635	0,0932025
Especie Animal				
Perro	0,8129252	0,0113766	0,7895738	0,8342293
Gato	0,1717687	0,0110035	0,1512419	0,1944432
Murciélago	0,0042517	0,0018982	0,0017685	0,010186
Mico	0,0042517	0,0018982	0,0017685	0,010186

Fuente: SIVIGILA Bucaramanga 2014

El tipo de agresión más común fue la mordedura (88%), seguido de los arañazos (11%). La mayoría de las lesiones fueron únicas (63%) donde el animal fue observable en un 76% de los casos. Es importante resaltar que el 23% de los animales no fueron observables y el 82% de los animales no cuentan con carnet de vacunas que permitan corroborar que han recibido la vacuna antirrábica, y que su esquema de vacunación está cumplido y actualizado.

Gráfica 4. Distribución por antecedente de vacunación en animales potencialmente transmisores de rabia, Bucaramanga, 2014

Fuente: SIVIGLA, Bucaramanga, 2014

La clasificación más frecuente del evento fue en *no exposición* con un 75,4%, seguida de las *exposiciones leves* con 16,9% y las *exposiciones graves* con un 7,6%.

Al realizar el cruce de variables se encontró que hay una relación significativa entre la comuna donde se presentan los eventos con el incumplimiento, cabe resaltar que la variable cumplimiento comprende: el tipo de exposición en el cual fue clasificado el evento, localización de la lesión, orden de vacuna, suero, sutura y si se realizó lavado de la mordedura con agua y jabón detergente.

En la Tabla 5 se presentan los resultados del cruce de variables usando la prueba de Chi cuadrado, encontrándose que el mayor porcentaje de incumplimiento se da en el régimen subsidiado frente al contributivo (16,1% vs 11,8% respectivamente, $p = 0.001$), y más acentuado en las comunas 1 (21%), la 4 (17,7%) y la comuna 17 (17,2%) con $p = 0,015$ para las tres. En el tipo de exposición donde hay mayor incumplimiento es la exposición leve con un 23,6% seguida de la exposición grave con un 22,6% ($p = 0.001$); esto guarda una relación si se observa que el mayor incumplimiento se dio en el envío de las ordenes de tratamiento como suturar la herida con un 35% ($p = 0.001$), la aplicación de suero con 22% ($p = 0.001$) y la aplicación de vacuna con 24% ($p = 0.001$).

Tabla 5. Relación de cumplimiento e incumplimiento de la guía de manejo con las demás variables que fueron significativas según ji cuadrado >0,05

Parámetro	Cumplimiento	Incumplimiento	P
Comunas			
1	78,95	21,05	0,015
2	84,44	15,56	
3	86,67	13,33	
4	82,22	17,78	
12	83,08	16,92	
15	88,57	11,43	
16	88,1	11,9	
17	82,76	17,24	
Tipo exposición			
No exposición	92,04	7,96	0,001
Exposición leve	76,37	23,63	
Exposición grave	77,32	22,68	
Herida Suturada			
Sí	64,89	35,11	0,001
No	89,65	10,35	
Aplicación de suero			
Sí	77,32	22,68	0,001
No	88,6	11,4	
Aplicación de vacuna			
Sí	75,74	24,26	0,001
No	92,48	7,52	
Seguridad social			
Contributivo	88,18	11,82	0,032
Subsidiado	83,94	16,06	

Fuente: SIVIGILA Bucaramanga 2014

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La rabia es una enfermedad que ha sido de interés público a nivel mundial desde hace mucho tiempo. El plan de acción para la prevención y el control de la rabia urbana de las principales ciudades de las Américas es una medida de Salud Pública que se viene promoviendo desde 1983. A pesar de que se ha presentado una disminución del 90% de los casos de rabia humana transmitidos por caninos, no deja de ser un evento de interés debido a que siguen existiendo factores que pueden hacer que esta cifra no descienda considerablemente (54).

En el departamento de Santander, García et. al (66) analizaron la aplicación de la guía de atención de rabia, encontrándose similitudes con el presente estudio en cuanto a que la población más afectada es la masculina residente en la zona urbana, siendo los canes el agresor predominante, seguidos del gato, el murciélago y el mico. En el manejo médico se encontró similitud en que el lavado de la herida no se realizó en su totalidad a los pacientes y se ordenó el procedimiento de sutura., así mismo se encuentra que el tratamiento no fue entregado en su totalidad, tal como sucedió durante el 2014 en Bucaramanga donde no hubo tratamiento antirrábico durante las semanas

La ocurrencia de incumplimiento de la guía de manejo para el año 2014 fue más acentuada en las comunas 1 (21%), la 4 (17,7%) y la comuna 17 (17,2%) con $p = 0,015$ para las tres. Con respecto a este hallazgo, podría señalarse que se trata de comunas periurbanas de acelerado crecimiento debido al desplazamiento de personas del área rural en busca de trabajo, en donde se subsiste con notorias privaciones y por ende son pocos los habitantes que se pueden encargar de vacunar por su propia pecunia y proveer alimentos a sus mascotas, por ende, los animales se ven en la obligada situación de vagar por las calles en busca de alimentos entre los residuos de las viviendas (67) lo cual hace aún más difícil su identificación y posible observación posterior.

En el área de Bucaramanga, durante el año 2014 se encontró que la especie animal que más agresiones causó fue el perro (81%), seguido por el gato (17%) lo cual nos indica que la exposición rábica es predominantemente urbana pese a que recientemente se ha venido señalando a los gatos como animales que cumplirían una función de hospedero urbano en mayor probabilidad de estar en contacto con los hospederos silvestres por naturaleza, los murciélagos. Estos datos concuerdan con lo reportado por Cediell et. al (68) en donde señalan a los animales domésticos como los principales causantes de rabia en humanos y que existe una periodicidad de aproximadamente 8 años entre los brotes, siendo el último el hallado en Santa Marta.

Concomitante con el hallazgo anterior, acorde a la especie agresora más frecuente, el tipo de agresión más común fue la mordedura (88%), seguido de los

arañazos (11%) y la mayoría de las lesiones fueron únicas (63%) donde el animal fue observable en un 76% de los casos. Es importante resaltar que el 23% de los animales no fueron observables y el 82% de los animales no cuentan con carnet de vacunas que permitan corroborar que han recibido la vacuna antirrábica, y que su esquema de vacunación está cumplido y actualizado; sumado a esto, actualmente las acciones posteriores a la exposición no se diferencian mucho de lo que sucedía en el año 1965, en donde casi todos los expuestos tenían que recibir tratamiento inmunoproláctico por la imposibilidad de identificar y observar el animal agresor (15). Estos hallazgos muestran que existe una imperiosa necesidad de fortalecer los programas de inmunización en las mascotas puesto que esta es la medida más efectiva para reducir la prevalencia de rabia en una zona determinada al tiempo que es menos costosa que vacunar en respuesta a la detección de casos (44).

En Colombia se menciona que existe una inversión de 6,8% del PIB en la atención de salud (69), existiendo una discordancia sobre la efectividad de su sistema sanitario en cuanto a los indicadores de Salud Pública y particularmente en el caso de rabia humana en donde han existido mayores casos incidentes en la región caribe colombiana que en las restantes, pese a que en 2003 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Protección Social (MPS) evaluaron el programa nacional de rabia y emitieron políticas para el mejoramiento del mismo (70) y que al final no evitaron los brotes de bajo Baudó por murciélagos hematófagos ni el brote de rabia humana por mordeduras de caninos en Santa Marta en el año 2006 (14,71) o los casos asociados a agresiones de gatos (72). Desde entonces, los 35 casos de rabia humana que se han presentado en Colombia entre 2010 y 2012, cinco fueron causados por perros y 30 causados por murciélagos, contrario a estas estadísticas, en el presente estudio, el comportamiento del evento durante el año 2014 tuvo una mayor prevalencia de agresiones por perros y no por murciélagos lo que llevaría a pensar en una disminución del fenómeno de traslado de la rabia silvestre hacia zonas urbanas pero enciende alarma en lo concerniente a que la mayor parte de los animales agresores no poseen un documento de vacunación que certifique el cumplimiento de la inmunización, además que una proporción no despreciable no pudo hacerseles seguimiento; es importante resaltar que durante el 2014 no hubo eventos de rabia en humanos en el municipio de Bucaramanga.

Con relación al incumplimiento de la guía se observó que este fue más prevalente en el sistema de salud del régimen subsidiado, primordialmente por el hecho de ordenar conductas terapéuticas inadecuadas como consecuencia de una mala clasificación de la exposición; esto pone de presente que es muy necesario que se haga capacitación continuamente a los prestadores de servicios de salud (IPS) para fortalecer su conocimiento sobre el evento de exposición rábica e igualmente fortalecer el programa de vigilancia epidemiológicas en las IPS para que se realice un adecuado reporte de los casos ya que Colombia ha sido catalogado como un área silenciosa para la rabia acorde a los criterios de la OPS (73) y este último es

un insumo adecuado y primordial para la elaboración de un mapa epidemiológico que se analice mensualmente para reducir al máximo la prevalencia de rabia en una determinada región; sumado a este mapa epidemiológico, son factores asociados al éxito de un programa de zoonosis: el contar con un centro de zoonosis para observación de animales agresores más un censo de mascotas que refuerce la tenencia responsable de animales y materialice las acciones de educación a la comunidad sobre la rabia humana (68,74).

7. CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio aportan al conocimiento sobre las exposiciones rábicas en la ciudad de Bucaramanga desde la perspectiva de los principales factores que contribuyen al detrimento en el cumplimiento de las metas de Salud Pública, además que son insumo de primera línea para el desarrollo de políticas en Vigilancia Epidemiológica y acciones en Salud Pública que permitan reducir en el mediano y largo plazo la incidencia de exposiciones rábicas, acompañadas de las acciones que se instauren desde el centro de Zoonosis para apoyar en el logro de los objetivos. Es evidente que las áreas periurbanas se perfilan como las zonas de mayor riesgo de contacto con el virus de la rabia y es allí donde se deben priorizar las medidas de vacunación masiva a las mascotas, la educación a la comunidad sobre la tenencia correcta de las mismas y las acciones a tomar cuando ocurre una agresión por animal sospechoso.

Es necesario que exista un trabajo interdisciplinar entre las instituciones municipales, departamentales y nacionales con el propósito de poder cumplir con los objetivos propuestos para el control de la rabia, garantizando los insumos tales como vacunas y suero antirrábico, asegurando así un manejo adecuado de la guía de rabia.

8. RECOMENDACIONES

1. Elaborar mapa de riesgo que permita visualizar la situación epidemiológica del Municipio.
2. Mantener capacitaciones constantes y actualizadas a las IPS y EPS sobre el manejo de los eventos epidemiológicos.
3. Realizar seguimiento a las IPS para verificar el cumplimiento de la guía, así como el diligenciamiento correcto y completo de la ficha epidemiológica.
4. Formar una cultura de responsabilidad social, donde se resalte a la comunidad la tenencia correcta de las mascotas y de su estado de vacunación.
6. Efectuar capacitaciones a la comunidad y realizar brigadas de concientización sobre el programa de la rabia, y de prevención.

BIBLIOGRAFÍA

1. Saad C, Martinez M, Walteros D, Saad Acosta C. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública - Rabia en Humanos, Perros y Gatos [Internet]. Bogotá, D.C., Colombia: Instituto Nacional de Salud; 2014. p. 1–43. Available from: [http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos SIVIGILA/PRO Rabia.pdf](http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Rabia.pdf)
2. Dietzgen R, Calisher C, Kurtah G, Kusmin I, Rodriguez L, Stone D. Virus taxonomy: classification and nomenclature of viruses: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. King A, Adams M, Carstens E, Lefkowitz E, editors. 2011.
3. Kuzmin I V, Mayer AE, Niezgoda M, Markotter W, Agwanda B, Breiman RF, et al. Shimon bat virus, a new representative of the Lyssavirus genus. *Virus Res* [Internet]. 2010 May [cited 2014 Dec 6];149(2):197–210. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170210000444>
4. Nadin-Davis SA, Abdel-Malik M, Armstrong J, Wandeler AI. Lyssavirus P Gene Characterisation Provides Insights into the Phylogeny of the Genus and Identifies Structural Similarities and Diversity within the Encoded Phosphoprotein. *Virology* [Internet]. 2002 Jul [cited 2014 Dec 13];298(2):286–305. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682202914923>
5. Loza Rubio E, Vargas R, Hernández E, Batalla D, Aguilar Setien A. Investigation of rabies virus strains in Mexico with a panel of monoclonal antibodies used to classify Lyssavirus. *Bull PAHO*. 1996;30:31–5.
6. Smith JS. Smith, J. S. (1996). New aspects of rabies with emphasis on epidemiology, diagnosis, and prevention of the disease in the United States. *Clinical Microbiology Reviews*, 9(2), 166–176. *Clin Microbiol Rev*. 1996;9.2:166–76.
7. Loza-Rubio E, Nadin-Davis SA, Salinas EM. Caracterización molecular y biológica del virus de la Rabia que circula en zorillos de México enfocado a la variante del gen de la fosfoproteína (P). *Rev Mex Ciencias Pecu* [Internet]. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias;

2012 [cited 2014 Dec 29];3(2):155–70. Available from:
<http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=265624467002>

8. Ruiz M, Chávez CB. Rabies in Latin America. *Neurol Res* [Internet]. Maney; 2010 Apr 1;32(3):272–7. Available from:
<http://dx.doi.org/10.1179/016164110X12645013284257>
9. Favi M, Nina A, Yung V, Fernández J. Characterization of rabies virus isolates in Bolivia. *Virus Res*. 2003;97:135–40.
10. Favi C M, Rodriguez A L, Espinosa M C, Yung P V. Rabia en Chile: 1989-2005. *Rev Chil infectología*. 2008;25.
11. Badilla X, Pérez-Herra V, Quirós L, Morice A, Jiménez E, Sáenz E, et al. Human rabies: A reemerging disease in Costa Rica? *Emerg Infect Dis*. 2003;9:721–3.
12. Favoretto SR, De Mattos CCA, De Moraes NB, Carrieri ML, Rolim BN, Silva LM, et al. Rabies virus maintained by dogs in humans and terrestrial wildlife, Ceará State, Brazil. *Emerg Infect Dis*. 2006;12:1978–81.
13. Cisterna D, Bonaventura R, Caillou S, Pozo O, Andreau ML, Dalla Fontana L, et al. Antigenic and molecular characterization of rabies virus in Argentina. *Virus Res*. 2005;109:139–47.
14. Valderrama J, García I, Figueroa G, Rico E, Sanabria J, Rocha N, et al. Brotes de rabia humana transmitida por vampiros en los municipios de Bajo y Alto Baudó, departamento del Chocó, Colombia 2004-2005. *Biomédica* [Internet]. 2006 Sep 1 [cited 2014 Dec 29];26(3):387. Available from:
<http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/357>
15. Escobar E. La rabia: Crónica de una experiencia. *Medicina (B Aires)*. 2005;27(4):249–55.
16. Escobar E. La rabia transmitida por vampiros. *Biomédica*. 2004;24:231–6.
17. Badillo R, Mantilla JC, Pradilla G. Encefalitis Rábica Humana por Mordedura de Murciélago en un Área Urbana de Colombia [Internet]. *Biomédica*. 2009.

p. 191–203. Available from:
<http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/21>

18. Fleming G. Rabies and Hydrophobia: their history, nature, causes, symptoms and prevention. Chapman and London; 1872.
19. Suraweera W, Morris SK, Kumar R, Warrell DA, Warrell MJ, Prabhat J. Deaths from Symptomatically Identifiable Furious Rabies in India: A Nationally Representative Mortality Survey. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6.10:e1847.
20. Chin J. El control de las enfermedades transmisibles [Internet]. 2001 [cited 2014 Dec 27]. 527 - 539 p. Available from:
<http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=HDvEf-SBQvQC&pgis=1>
21. de Souza A, Madhusudana SN. Survival from rabies encephalitis. J Neurol Sci [Internet]. 2014 Apr 15 [cited 2014 Dec 4];339(1-2):8–14. Available from:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X14000999>
22. Willoughby R, Tieves K, Hoffman G, Ghanayem N, Amile-Lefond C, Schwab M, et al. Survival after Treatment of Rabies with Induction of Coma. N Engl J Med. 2005;352:2508–14.
23. Hattwick M, Weis T, Stechschulte C, Baer G, Gregg M. Recovery from rabies. A case report. Ann Intern Med. 1972;76:931–42.
24. KARAHOCAGİL MK, AKDENİZ H, AYLAN O, SÜNNETÇİOĞLU M, ÜN H, YAPICI K, et al. Complete Recovery from Clinical Rabies: Case Report. Türkiye Klin J Med Sci [Internet]. Türkiye Klinikleri; 2013 [cited 2014 Dec 29];33(2):547–52. Available from: <http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-complete-recovery-from-clinical-rabies-case-report-64465.html>
25. Lafon M. Immunology. In: Jackson A, Wunner W, editors. Rabies. 2nd ed. Elsevier; 2007. p. 489–504.
26. Jackson AC. Therapy of rabies encephalitis. Biomédica [Internet]. Instituto Nacional de Salud; [cited 2014 Dec 29];29(2):169–76. Available from:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

27. Hemachudha T, Laothamatas J, Rupprecht CE. Human rabies: A disease of complex neuropathogenetic mechanisms and diagnostic challenges. *Lancet Neurology*. 2002. p. 101–9.
28. Centers for Disease Control Prevention (CDC). Presumptive abortive human rabies—Texas, 2009. *MMWR Morb Mortal Wkly*. 2010;59:185–90.
29. Centers for Disease Control Prevention (CDC). Recovery of a patient from clinical rabies-California, 2011. *MMWR Morb Mortal Wkly*. 2012;61:61–5.
30. Hemachudha T, Wacharapluesadee S, Laothamatas J, Wilde H. Rabies. *Curr Neurol Neurosci Rep* [Internet]. 2006 Nov [cited 2014 Dec 29];6(6):460–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17074280>
31. Tillotson J, Axelrod D, Lyman D. Rabies in a laboratory worker. *MMWR Morb Mortal Wkly*. 1977;26:183–4.
32. Jackson AC. Why does the prognosis remain so poor in human rabies? *Expert Rev Anti Infect Ther* [Internet]. 2010 Jun [cited 2014 Dec 29];8(6):623–5. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20521888>
33. Jackson AC, Warrell MJ, Rupprecht CE, Ertl HCJ, Dietzschold B, O'Reilly M, et al. Management of rabies in humans. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2003 Jan 1 [cited 2014 Dec 16];36(1):60–3. Available from: <http://cid.oxfordjournals.org/content/36/1/60.full>
34. Madhusudana SN, Nagaraj D, Uday M, Ratnavalli E, Kumar MV. Partial recovery from rabies in a six-year-old girl. *Int J Infect Dis* [Internet]. 2002 Mar [cited 2014 Dec 29];6(1):85–6. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12118432>
35. Alvarez L, Fajardo R, Lopez E, Pedroza R, Hemachudha T, Kamolvarin N, Cortes G, et al. Partial recovery from rabies in a nine-year-old boy. *Pediatr Infect Dis J*. 1994;13.12:1154–5.

36. Hamir AN, Niezgoda M, Rupprecht CE. Recovery from and clearance of rabies virus in a domestic ferret. *J Am Assoc Lab Anim Sci* [Internet]. 2011 Mar [cited 2014 Dec 29];50(2):248–51. Available from: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3061427&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
37. Gadre G, Satishchandra P, Mahadevan A, Suja MS, Madhusudana SN, Sundaram C, et al. Rabies viral encephalitis: clinical determinants in diagnosis with special reference to paralytic form. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2010;81:812–20.
38. Solanki A, Radotra BD, Vasishta RK. Correlation of cytokine expression with rabies virus distribution in rabies encephalitis. *J Neuroimmunol*. 2009;217:85–9.
39. Maier T, Schwarting A, Mauer D, Ross RS, Martens A, Kliem V, et al. Management and outcomes after multiple corneal and solid organ transplantations from a donor infected with rabies virus. *Clin Infect Dis*. 2010;50:1112–9.
40. Emmons RW, Leonard LL, DeGenaro F, Protas ES, Bazeley PL, Giammona ST, et al. A case of human rabies with prolonged survival. *Intervirology* [Internet]. 1973 Jan [cited 2014 Dec 29];1(1):60–72. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4589643>
41. Hooper DC, Roy A, Kean RB, Phares TW, Barkhouse DA. Therapeutic immune clearance of rabies virus from the CNS. *Future Virol*. 2011;6:387–97.
42. Johnson N, Cunningham AF, Fooks AR. The immune response to rabies virus infection and vaccination. *Vaccine*. 2010;28:3896–901.
43. Dedmon R, Briggs D, Lembo T, Cleaveland S. One health: Collaboration, recent research and developments in the global effort to eliminate Rabies. *Int J Infect Dis* [Internet]. Elsevier; 2010 Mar 3 [cited 2014 Dec 27];14:e159. Available from: <http://www.ijidonline.com/article/S1201971210018734/fulltext>
44. Townsend SE, Lembo T, Cleaveland S, Meslin FX, Miranda ME, Putra AAG, et al. Surveillance guidelines for disease elimination: a case study of canine

rabies. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis* [Internet]. 2013 May [cited 2014 Dec 27];36(3):249–61. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147957112001221>

45. Henderson D. Inter-Regional Seminar on Surveillance and Assessment in Smallpox Eradication, World Health House, New Delhi, India, November 30-December 5, 1970. Geneva, Switzerland : World Health Organization; 1971. 3 p.
46. Knobel DL, Cleaveland S, Coleman PG, Fèvre EM, Meltzer MI, Miranda MEG, et al. Re-evaluating the burden of rabies in Africa and Asia. *Bull World Health Organ*. 2005;83:360–8.
47. Schneider MC, Belotto A, Adé MP, Hendrickx S, Leanes LF, Rodrigues MJ de F, et al. Current status of human rabies transmitted by dogs in Latin America. *Cadernos de Saúde Pública*. 2007. p. 2049–63.
48. Townsend SE, Lembo T, Cleaveland S, Meslin FX, Miranda ME, Putra AAG, et al. Surveillance guidelines for disease elimination: a case study of canine rabies. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis*. 2013 May;36(3):249–61.
49. Lardon Z, Watier L, Brunet A, Bernède C, Goudal M, Dacheux L, et al. Imported episodic rabies increases patient demand for and physician delivery of antirabies prophylaxis. *PLoS Negl Trop Dis*. 2010;4.
50. Susilawathi NM, Darwinata AE, Dwija IBNP, Budayanti NS, Wirasandhi GAK, Subrata K, et al. Epidemiological and clinical features of human rabies cases in Bali 2008-2010. *BMC Infect Dis* [Internet]. 2012 Jan [cited 2014 Dec 28];12(1):81. Available from: <http://www.biomedcentral.com/1471-2334/12/81>
51. Windiyaningsih C, Wilde H, Meslin FX, Suroso T, Widarso HS. The rabies epidemic on Flores Island, Indonesia (1998-2003). *Journal of the Medical Association of Thailand*. 2004. p. 1389–93.
52. World Health Organization. WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. [Internet]. World Health Organization technical report series. 2013 [cited 2014 Dec 27]. 1-139, back cover p. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24069724>

53. Halliday J, Daborn C, Auty H, Mtema Z, Lembo T, Bronsvoort BMD, et al. Bringing together emerging and endemic zoonoses surveillance: shared challenges and a common solution. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2012 Oct;367(1604):2872–80.
54. Salud OP de la. Plan de acción para la prevención y el control de la rabia en las Américas Etapa 2005 - 2009 [Internet]. Rio de Janeiro; 2005 p. 1–33. Available from: <http://fos.panalimentos.org/LinkClick.aspx?fileticket=slrWQ443N5I=&tabid=554&mid=1242&language=en-US>
55. Walteros Acero DM, Ángela CD, Zoonosis GF. Rabia Humana y Rabia Animal: Situación Actual en Colombia Periodo Epidemiológico Quinto del 2012. Bogotá, Colombia; 2012. p. 1–28.
56. Mejia Angarita F, López Martinez L. Informe epidemiológico de Santander. Reporte de casos de rabia humana. Santander 2008 a 2010. Inf Epidemiológico Santander [Internet]. Santander; 2010;3. Available from: <http://web.saludsantander.gov.co/index.php/publicaciones/informe-epidemiologico/337-informe-epidemiologico-de-santander-ano-iv-numero-3-2010/file>
57. Social M de la P. Decreto Número 3518 de 2006 [Internet]. Colombia; 2006 p. 17. Available from: <http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Documentos SIVIGILA/Decreto 3518 06 Crea y reglamenta el SIVIGILA.pdf>
58. Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. REDIPRA 14: Reunión de Directores de los Programas Nacionales de Control de Rabia en América Latina [Internet]. Lima - Perú; 2013. p. 1–48. Available from: <http://bvs1.panaftosa.org.br/local/file/textoc/REDIPRA14.pdf>
59. Morales AR, Zárate LEM. Estudios de corte transversal. In: Editorial Médica Internacional, editor. *Epidemiología Clínica: Investigación Clínica Aplicada*. Bogotá, D.C., Colombia; 2004. p. 198 a 211.
60. L. Cabrera, J. Benítez MA& PP. Un Estudio Transversal Retrospectivo Sobre Prolongación Y Abandono De Estudios Uni- Versitarios. *Rev ELectrónica Investig y EValuación Educ* [Internet]. 2006;12(1):105–27. Available from:

http://www.uv.es/RELIEVE/v12n1/RELIEVEv12n1_1.htm

61. Langholz B. Case-Control Study, Nested. In: Encyclopedia of Biostatistics [Internet]. Chichester: New York , John Wiley & Sons; 2005. p. 646–65. Available from: http://hydra.usc.edu/pm518b/literature/eob_nested.pdf
62. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [Internet]. Helsinki, Finlandia, Finlandia: Asociación Médica Mundial; 1964. Available from: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/>
63. Ministerio de Salud República de Colombia. Resolución N° 008430 [Internet]. Ministerio de Salud; 1993 p. 12. Available from: http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_etica/Res__8430_1993_-_Salud.pdf
64. Congreso de Colombia. Ley 84 de 1989 [Internet]. Bogotá, D.C., Colombia, D.C., Colombia: Congreso de Colombia; 1989. Available from: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/>
65. Consejo De Organizaciones Internacionales, Cioms DLICM, Oms OMDLS, Who WHO. Pautas Éticas para la Investigación Biomédica en Seres Humanos = [Ethical Guidelines for Biomedical Research on Human Beings] [Internet]. Geneva. 2002 [cited 2014 Dec 28]. Available from: http://www.cioms.ch/publications/guidelines/pautas_eticas_internacionales.htm
66. GARCIA D, BUENAÑOS J, PINZÓN E. Estudio de la aplicación de la guía para la atención de personas agredidas por animales potencialmente transmisores de rabia, en Bucaramanga y el área metropolitana de enero a junio de 2008. Universidad Autónoma de Bucaramanga; 2008.
67. Acha P, Szyfres B, Organización Panamericana de Salud. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales: Clamidiosis, rickettsiosis y virosis. In: Zoonosis y Enfermedades Transmisibles Comunes al Hombre y a los Animales. 2003. p. 425.
68. Cediell N, de la Hoz F, Villamil LC, Romero J, Díaz A. Epidemiología de la rabia canina en Colombia. Rev Salud Pública. 2010;12(3):368–79.

69. Gasto en salud, total (% del PIB) del periodo 2000 a 2014.
70. Alvis G N. From the Human Rabie of Canine Origen and Other Shames. Rev MVZ Córdoba. 2006;11(2):779–80.
71. Páez A, Rey G, Agudelo C, Dulce Á, Parra E, Díaz-granados H, et al. Brote de rabia urbana transmitida por perros en el distrito. Biomedica. 2009;29(424):36.
72. Pradilla G. Rabia: 4.000 años de vigencia. Salud UIS. 2010;42(2):2008–11.
73. Belotto A, Leanes LF, Schneider MC, Tamayo H, Correa E. Overview of rabies in the Americas. Virus Res [Internet]. 2005;111(1):5–12. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15896398>
74. Rupprecht CE, Hanlon CA, Slate D. Control and prevention of rabies in animals: paradigm shifts. Dev Biol (Basel) [Internet]. 2006 Jan [cited 2015 Oct 3];125:103–11. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16878466>

TABLA OPERATIVA DE LAS VARIABLES

NOMBRE DE VARIABLE	TIPO DE VARIABLE	DEFINICIÓN OPERATIVA	CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS	INDICADOR	NIVEL DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ÍNDICE	VALOR	PROPIEDADES MATEMÁTICAS	PRUEBA ESTADÍSTICA	TÉCNICA ESTADÍSTICA
Variable dependiente Incumplimiento de guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	Cualitativa	Clasificación y tratamiento incorrectos según lo establecido en la guía de manejo	- Sí - No	- Incumplimiento de la guía de manejo. - Cumplimiento de la guía de manejo	- Valor Absoluto - % Sí - % No	- Nominal Dicotómica	- Sí - No	- Incumplimiento/Cumplimiento	- 0= Sí - 1= No	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado
Edad	Cuantitativa	Cantidad de años cumplidos en la fecha de la agresión	Según la exploración de los datos: - Categorías de edad (porcentaje) - Media de Edad - Mediana de Edad	Según la exploración de los datos: - Proporción de población en los distintos grupos de edad. - Media aritmética de la edad - Mediana: Es la edad que divide a la población en dos grupos de igual número de personas	- Cálculo a partir de la fecha de nacimiento registrada en la documentación.	- De razón - Continua	- Años cumplidos - % categorías	- Edad al momento de la agresión	- Numérico - 1= cat1 - 2= cat2 - 3= cat3 - Etc.	- De equivalencia - Razón entre dos intervalos calculables - Razón entre dos valores de la escala calculable	- Paramétrica - No paramétrica	- Media - Mediana - Moda - Frecuencias - Porcentajes - Cuartiles - Rango - Desviación Estándar - Chi Cuadrado
Género	Cualitativa	Cualidad biológica de	- Hombre - Mujer	Por caracteres	- Valor Absoluto	- Nominal Dicotómico	- Masculino - Femenino	- Razón Hombre/M	- 0= Hombre	Relación de equivalencia	No paramétrica	- Frecuencias

		los humanos		sexuales secundarios	- % Hombres - % Mujeres	a		ujer	- 1= Mujer	(número asignado)		ias - Porcentajes - Chi Cuadrado
Tipo de lugar de agresión Tip_ar_agr	Cualitativa	Tipo de área de agresión definida por urbana y rural	- Urbana - Rural	Es el tipo de lugar geográfico donde la persona fue agredida	Área de la agresión	- Nominal - Politémica	- Urbana - Rural	- Índice Lugar 1/Lugar 2 - Con otras áreas: lugar de atención (reporte del caso) - Lugar de residencia	- 0= Urbana - 1= Rural	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado
Comuna de la agresión Com_agres	Cualitativa	Es la comuna urbana donde la persona fue agredida. Aplica a las personas que fueron agredidas en área urbana.	- Comuna 1 - Comuna n17	Es la comuna urbana donde la persona fue agredida	Comuna urbana donde ocurrió la agresión	- Nominal - Politémica	- Comuna 1 - Comuna n17.	- Índice Lugar 1/Lugar 2 - Con otras áreas: lugar de atención (reporte del caso) - Lugar de residencia	- 0= Comuna n1 - 1= Comuna n2 - Etc...	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado
Régimen de Seguridad Social Reg_ss	Cualitativa	Clasificación del Régimen de Seguridad Social del paciente registrado en SIVIGILA	- 0= Contributivo - 1= Beneficiario - 2= Especial - 3= Subsidiario - 4= SISBEN - 5= Sin Seguridad Social	Según la clasificación del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.	- Valor Absoluto - Porcentajes	- Ordinal - Discreta - Politémica	- Régimen de seguridad social	- Razón Nivel 1/ Nivel 2	- 0= Contributivo - 1= Beneficiario - 2= Especial - 3= Subsidiario - 4= SISBEN - 5= Sin Seguridad Social	Relación de equivalencia (número asignado) Mayor que	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado
Raza	Cualitativa	Cualidad	- Mestiza	Característico	- Valor	- Nominal	Mestiza	- Razón	- 0= Mestiza	Relación de	No	-

Raza		biológica de los humanos	- Blanca - Afrodescendiente - Indígena - otras	as definidas por herencia genética	Absoluto - % raza 1 - % raza n	Dicotómica	- Blanca - Afrodescendiente - Indígena - otras	raza 1/raza n	- 1= Blanca - 2= Afrodescendiente - 3= Indígena - 4= otra	equivalencia (número asignado)	paramétrica	Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado
Hospitalización Hosp	Cualitativa	Hospitalización en IPS del paciente por la agresión	- Sí - No	- Hospitalizado - No hospitalizado	- Valor Absoluto - % Sí - % No	- Nominal Dicotómica	- Sí - No	- Hospitalizado/no hospitalizado	- 0= Sí - 1= No	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes
Muerte muerte	Cualitativa	Condición vital del paciente al final del seguimiento	- Sí - No	- Muerto - Vivo	- Valor Absoluto - % Muertos - % Vivos	- Nominal Dicotómica	- Sí - No	- Muertos/Vivos	- 0= Sí - 1= No	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - y múltiple
Fecha de muerte F_muerte	Cuantitativa	Hito: fecha en que el paciente fallece por la agresión	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Tipo de caso Tip_caso	cualitativa	Tipo de caso según clasificación de la guía de manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores	- sospecho - probable - confirmado laboratorio - confirmación clínica -nexo epidemiológico	Tipo de caso según guía de manejo	Tipo de caso según guía de manejo - Valor Absoluto - % Muertos - % Vivos	- Nominal - Politémica	- sospecho - probable - confirmado laboratorio - confirmación clínica -nexo epidemiológico	-Índice tipo 1/Tipo n	0= sospecho 1=probable 2= confirmado laboratorio 3= confirmación clínica	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y

		de rabia	gico				gico		4= nexo epidemioló gico			múltiple
Fecha de ajustes del evento F_ajustes	Cuantitativa	Hito: fecha en que se finalizan los ajustes de seguimiento de la agresión	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalenc ia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuenc ias - Porcenta jes - Media - Mediana - Moda
Peso del paciente peso	Cuantitativa	Peso en kilogramos registrado en la ficha epidemiológi ca usado para calcular las dosis de suero y/o vacuna	Según la exploración de los datos: - Categorías de peso (porcentaje) - Media de peso - Mediana de peso	Según la exploración de los datos: - Proporción de población en los distintos grupos de peso. - Media aritmética del peso - Mediana: Es el peso que divide a la población en dos grupos de igual número de personas	- Peso registrado en la documenta ción.	- De razón - Continua	- peso en kilogramos - % categorías	- peso al momento de la atención médica por la agresión	- Numérico - 1= cat1 - 2= cat2 - 3= cat3 - Etc.	- De equivalenc ia - Razón entre dos intervalos calculable s - Razón entre dos valores de la escala calculable	- Paramétri ca - No paramétric a	- Media - Mediana - Moda - Frecuenc ias - Porcenta jes - Cuartiles - Rango - Desviaci ón Estándar - Prueba t de Student / U de Mann- Whitney - Coeficien tes de Variación - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Mecanismo	Cualitativa	Tipo de	- mordedura	Es el	Tipo de	- Nominal	- mordedura	- Índice	0=-	Relación de	No	-

de agresión Mec_agres		agresión definida por mecanismo	- arañazo - lamedura mucosas piel - contacto de saliva con piel lesionada - otros	mecanismo que el animal utilizó en la agresión. Se toma la más severa,	mecanismo de agresión - Valor Absoluto - % mecanismo	- Politémica	- arañazo - lamedura mucosas piel - contacto de saliva con piel lesionada - otros	mecanismo 1/mecanismo 2	mordedura 1= arañazo 2=lamedura mucosas piel 3= contacto de saliva con piel lesionada 4= otros	equivalencia (número asignado)	paramétrica	Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Otro tipo de lesión Otro_mech	Cualitativa	Otro tipo de agresión definida por mecanismo que no se clasificó en variable anterior	Según la exploración de los datos	Es el mecanismo que el animal utilizó en la agresión. Se toma la más severa,	Tipo de mecanismo de agresión - Valor Absoluto - % mecanismo	- Nominal - Politémica	Según la exploración de los datos	- Índice mecanismo 1/mecanismo 2	Según la exploración de los datos	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Agresión provocada Agr_provoc	Cualitativa	Reporte sobre la provocación de la agresión del animal por parte del paciente	- Sí - No	- Provocada - No provocada	Agresión provocada por el paciente - Valor Absoluto - % Provocada - %No provocada	- Nominal Dicotómica	- Sí - No	- Provocada/no provocada	- 0= Sí - 1= No	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Número de lesión Num_lesion	Cualitativa	Número de lesiones producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia	- Única - Múltiple	- Única - Múltiple	Número de lesiones producidas en la agresión - Valor Absoluto - % Única - % múltiple	- Nominal - Dicotómica	- Única - Múltiple	- Única/múltiple	- 0= única - 1= múltiple	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística

												simple y múltiple
Profundidad de la(s) lesión(es) profund	Cualitativa	profundidad de lesiones producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia	- Superficial - Profunda	- Superficial - Profunda	Profundidad de las lesiones producidas en la agresión - Valor Absoluto - % superficial - % profunda	- Nominal - Dicotómica	- Superficial - Profunda	- razón superficial/profunda	- 0= superficial - 1= profunda	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Localización cabeza cara o cuello Lug_ccc	Cualitativa	Lesiones en cabeza, cara o cuello producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia	- Sí - No	- Sí - No	Presencia de lesiones en cabeza, cara y cuello producidas en la agresión - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Localización mano Lug_mano	Cualitativa	Lesiones en mano producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia	- Sí - No	- Sí - No	Presencia de lesiones en cabeza, cara y cuello producidas en la agresión - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Localización tronco	Cualitativa	Lesiones en tronco	- Sí - No	- Sí - No	Presencia de	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia	No paramétrica	- Frecuenc

Lug_tronco		producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia			lesiones en cabeza, cara y cuello producidas en la agresión - Valor Absoluto - % sí - % no					(número asignado)		ias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Localización miembro superior	Cualitativa	Lesiones en cabeza, cara o cuello producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia	- Sí - No	- Sí - No	Presencia de lesiones en cabeza, cara y cuello producidas en la agresión - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Localización miembro inferior Lug_mmii	Cualitativa	Lesiones en miembros inferiores producidas en la agresión por el animal potencialmente transmisor de rabia	- Sí - No	- Sí - No	Presencia de lesiones en cabeza, cara y cuello producidas en la agresión - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Especie animal Esp_animal	Cualitativa	Tipo de animal agresor potencialme	- perro - gato - Bovino - equino	- perro - gato - Bovino - equino	Tipo de animal agresor potencialm	- Nominal - Politómica	- perro - gato - Bovino - equino	- razón animal 1/animal n	0= perro 1= gato 2= Bovino 3= equino	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias

		nte transmisor de rabia	- porcino - murciélago - zorro - mico - humano - otros domésticos - otros silvestres	- porcino - murciélago - zorro - mico - humano - otros domésticos - otros silvestres	ente transmisor de rabia - Valor Absoluto - % animal agresor 1 - % animal agresor n		- porcino - murciélago - zorro - mico - humano - otros domésticos - otros silvestres		4= porcino 5= murciélago 6= zorro 7= mico 8= humano 9= otros domésticos 10= otros silvestres			Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Antecedente vacunación animal agresor Vac_animal	Cualitativa	Estado de vacunación del animal potencialmente transmisor de rabia en el momento de la agresión	- Sí - No	- Sí - No	Estado de vacunación del animal potencialmente transmisor de rabia en el momento de la agresión reportado en SIVIGILA - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Fecha vacunación animal agresor F_vac_anml	Cuantitativa	Hito: fecha de la última vacunación del animal agresor verificado con carné de vacunación	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Presentó carné de vacunas Carné_vac	Cualitativa	Revisión documental del carné de vacunación del animal	- Sí - No	- Sí - No	Evidencia del carné de vacunación del	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes

		potencialmente transmisor de rabia en el momento de la agresión			animal agresor - Valor Absoluto - % sí - % no							jes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Propietario dueño	Cualitativa	Constatación de propiedad del animal potencialmente transmisor de rabia en el momento de la agresión	- Sí - No	- Sí - No	Propiedad del animal agresor - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Estado del animal al momento de la agresión signos	Cualitativa	Presencia o no de signos de rabia en el animal agresor potencialmente transmisor de rabia en el momento del evento	- con signos - sin signos - desconocido	- con signos - sin signos - desconocido	Tipo de animal agresor potencialmente transmisor de rabia - Valor Absoluto - % animal agresor 1 - % animal agresor n	- Nominal - Politémica	- con signos - sin signos - desconocido	- razón cat 1/cat n	0= con signos 1= sin signos 2= desconocido	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Ubicación del animal ubic_anml	Cualitativa	Tipo de observación del animal agresor potencialmente transmisor de rabia en el momento del evento	- En observación - perdido - muerto	- En observación - perdido - muerto	Tipo de observación del animal agresor potencialmente transmisor de rabia - Valor Absoluto	- Nominal - Politémica	- En observación - perdido - muerto	- razón cat 1/cat n	0= en observación 1= perdido 2= muerto	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y

					- % en observación - % perdido - % muerto							múltiple
Tipo de exposición Tip_expo	Cualitativa	Tipo de exposición en la agresión del animal agresor potencialmente transmisor de rabia	- No exposición - Exposición leve - Exposición grave	- No exposición - Exposición leve - Exposición grave	Tipo de exposición en la agresión del animal agresor potencialmente transmisor de rabia - Valor Absoluto - % no exposición % Exp. leve - % Exp. grave	- Nominal - Politémica	- No exposición - Exposición leve - Exposición grave	- razón cat 1/cat n	0= no exposición 1= Exp. leve 2= Exp. grave	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Antecedente de suero en el paciente Ant_suero	Cualitativa	Antecedente de aplicación de suero en el paciente previamente a la agresión por la cual consulta	- Sí - No	- Sí - No	Antecedente de uso de suero antirábico - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Fecha de aplicación del suero F_ant_suero	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó suero antirábico previo a agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continúa	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda

Antecedente de vacunación en el paciente Ant_vac	Cualitativa	Antecedente de aplicación de vacuna en el paciente previamente a la agresión por la cual consulta	- Sí - No	- Sí - No	Antecedente de uso de vacuna antirrábica - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	intervalos Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado M-H - Regresión logística simple y múltiple
Número de dosis que recibió Dosis_vac_n	Cuantitativa	Cantidad de dosis administradas efectivamente al paciente agredido al final del seguimiento	Según la exploración de los datos: - Categorías (porcentaje) hasta 5 dosis - Media - Mediana	Según la exploración de los datos: - Proporción de población en los distintos grupos de dosis administradas - Media aritmética de las dosis administradas - Mediana: Es el número de dosis de vacuna que divide a la población en dos grupos de igual número de personas	- Número de dosis de vacunas administradas registrado en la documentación.	- De razón - Continua	- Dosis administradas - % categorías	- dosis administradas	- Numérico - 1= cat1 - 2= cat2 - 3= cat3 - Etc.	- De equivalencia - Razón entre dos intervalos calculables - Razón entre dos valores de la escala calculable	- Paramétrica - No paramétrica	- Media - Mediana - Moda - Frecuencias - Porcentajes - Cuartiles - Rango - Desviación Estándar - Prueba t de Student / U de Mann-Whitney - Coeficientes de Variación - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Fecha de la última dosis	Cuantitativa	Hito: fecha en que se	Se construirán	Según la exploración	Fecha reportada	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables	Formato fecha	- Relación de	No paramétrica	- Frecuencia

de vacuna AR (antecedente) F_ant_vac		aplicó vacuna antirrábica previa a agresión actual.	categorías según la exploración de los datos	de los datos	en SIVIGILA			que se relacionen		equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	y paramétrica	ias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Lavado de herida con agua y jabón Lav_herida	Cualitativa	Lavado de herida(s) del paciente agredido en su atención médica del evento	- Sí - No	- Sí - No	Lavado de herida con agua y jabón - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Sutura de la herida sutura	Cualitativa	Sutura de heridas del paciente agredido en su atención médica del evento	- Sí - No	- Sí - No	Sutura de heridas de la agresión - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Ordenó aplicación de suero Orden_suero	Cualitativa	Orden del médico para la aplicación de suero antirrábico para el paciente agredido	- Sí - No	- Sí - No	Orden médica de aplicación de suero antirrábico - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística

												simple y múltiple
Ordenó aplicación de vacuna Orden_vacuna	Cualitativa	Orden del médico para la aplicación de vacuna antirrábica para el paciente agredido	- Sí - No	- Sí - No	Orden médica de aplicación de vacuna antirrábica - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Fecha de aplicación de suero F_suero	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó vacuna antirrábica previa a agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Número de frascos ordenados Suero_frc_n	Cuantitativa	Cantidad de frascos de suero ordenados por el médico tratante efectivamente al paciente agredido al final del seguimiento	Según la exploración de los datos: - Categorías (porcentaje) hasta 5 dosis - Media - Mediana	Según la exploración de los datos: - Proporción de población en los distintos grupos de frascos administrados de suero - Media aritmética de las dosis administradas - Mediana:	- Número de frascos de suero ordenados registrado en la documentación.	- De razón - Continua	- Dosis administradas - % categorías	- dosis administradas	- Numérico - 1= cat1 - 2= cat2 - 3= cat3 - Etc.	- De equivalencia - Razón entre dos intervalos calculables - Razón entre dos valores de la escala calculable	- Paramétrica - No paramétrica	- Media - Mediana - Moda - Frecuencias - Porcentajes - Cuartiles - Rango - Desviación Estándar - Prueba t de Student / U de Mann-

				Es el número de frascos de suero que divide a la población en dos grupos de igual número de personas								Whitney - Coeficientes de Variación - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Reacción a la aplicación del suero Reac_suero	Cualitativa	Reacción adversa luego de la aplicación del suero antirrábico en el manejo de la agresión	- Sí - No	- Sí - No	Reacción adversa al suero antirrábico - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Tipo de reacción a la aplicación del suero Tipo_R_suero	Cualitativa	Reacción adversa luego de la aplicación del suero antirrábico en el manejo de la agresión	- Generalizada - Localizada	- Generalizada - Localizada	Reacción adversa al suero antirrábico - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Generalizada - Localizada	- razón generalizada/localizada	- 0= generalizada - 1= localizada	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Fecha de primera dosis de vacuna F_dosisv_1	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó dosis 1 de vacuna antirrábica en el manejo de la agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda

										entre dos intervalos		
Fecha de segunda dosis de vacuna F_dosisv_2	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó dosis 2 de vacuna antirrábica en el manejo de la agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Fecha de tercera dosis de vacuna F_dosisv_3	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó dosis 3 de vacuna antirrábica en el manejo de la agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Fecha de cuarta dosis de vacuna F_dosisv_4	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó dosis 4 de vacuna antirrábica en el manejo de la agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
Fecha de quinta dosis de vacuna F_dosisv_5	Cuantitativa	Hito: fecha en que se aplicó dosis 5 de vacuna antirrábica en el manejo de la agresión actual.	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda

										- Razón calculable entre dos intervalos		
Reacción a la aplicación del suero Reac_vac	Cualitativa	Reacción adversa luego de la aplicación de la vacuna antirrábica en el manejo de la agresión	- Sí - No	- Sí - No	Reacción adversa al vacuna antirrábica - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Tipo de reacción a la aplicación del suero Tipo_R_vac	Cualitativa	Reacción adversa luego de la aplicación de la vacuna antirrábica en el manejo de la agresión	- Generalizada - Localizada	- Generalizada - Localizada	Reacción adversa al vacuna antirrábica - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Generalizada - Localizada	- razón generalizada/localizada	- 0= generalizada - 1= localizada	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
El paciente suspendió el tratamiento suspension	Cualitativa	Suspensión del tratamiento médico de la agresión del paciente	- Sí - No	- Sí - No	Suspensión del tratamiento - Valor Absoluto - % sí - % no	- Nominal - Dicotómica	- Sí - No	- razón sí/no	- 0= sí - 1= no	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
El paciente suspendió el tratamiento por:	Cualitativa	Causa de la suspensión del tratamiento	- Orden médica - Voluntaria	- Orden médica - Voluntaria	Reacción adversa al vacuna antirrábica	- Nominal - Dicotómica	- Orden médica - Voluntaria	- razón orden médica/causa	- 0= orden médica - 1= voluntaria	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias

Causa_sus p		del paciente agredido			- Valor Absoluto - % Orden médica - % Voluntaria			voluntaria				Porcenta jes - Chi Cuadrado - M-H - Regresión logística simple y múltiple
Número de días de observación del animal agresor Días_obsv	Cuantitativa	Número de días de observación del animal agresor, cuando aplica	Según la exploración de los datos: - Categorías (porcentaje) hasta 5 dosis - Media - Mediana	Según la exploración de los datos: - Proporción de días de observació n - Media aritmética de los días de observació n del animal - Mediana: Es el número de días de observación que divide a la población en dos grupos de igual número de personas	- Número de frascos de días de observació n del animal agresor registrado en la document ación.	- De razón - Continua	- días de observació n del animal - % categorías	- días de observació n	- Numérico - 1= cat1 - 2= cat2 - 3= cat3 - Etc.	- De equivalenc ia - Razón entre dos intervalos calculable s - Razón entre dos valores de la escala calculable	- Paramétri ca - No paramétric a	- Media - Mediana - Moda - Frecuenc ias - Porcenta jes - Cuartiles - Rango - Desviaci ón Estándar - Prueba t de Student / U de Mann- Whitney - Coeficien tes de Variación - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Lugar de observación del animal agresor Lug_obs	Cualitativa	Es el sitio donde se realiza la observación del animal agresor	- Vivienda - Clínica veterinaria - Centro de zoonosis	Sitio de observación del animal agresor	Sitio de observación del animal agresor -Valor absoluto	- Nominal - Politémica	- Vivienda - Clínica veterinaria - Centro de zoonosis	- Índice Lugar 1/Lugar 2	0= Vivienda 1= Clínica veterinaria 2= Centro de zoonosis	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuenc ias - Porcenta jes - Chi

					- % Vivienda - % Clínica veterinaria - % Centro de zoonosis							Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple
Estado del animal luego de la observación Animal_v_m	Cualitativa	Condición vital del animal al final del seguimiento	- Sí - No	- Muerto - Vivo	- Valor Absoluto - % Muertos - % Vivos	- Nominal Dicotómica	- Sí - No	- Muertos/Vivos	- 0= Sí - 1= No	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado M-H - Regresión logística simple y múltiple
Fecha muerte del animal agresor F_mrt_animal	Cuantitativa	Hito: fecha en que el animal agresor fallece	Se construirán categorías según la exploración de los datos	Según la exploración de los datos	Fecha reportada en SIVIGILA	De intervalo Continua	Día/Mes/Año	Con otras variables que se relacionen	Formato fecha	- Relación de equivalencia (número asignado) - Mayor que - Razón calculable entre dos intervalos	No paramétrica y paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Media - Mediana - Moda
IPS que reporta IPS_UPGD	Cualitativa	Es la IPS donde se atiende al paciente por la agresión por animal potencialmente transmisor de rabia	- IPS 1 - IPS n	Es la IPS que realiza la atención médica	IPS reportada al SIVIGILA	- Nominal - Politémica	- IPS 1 - IPS n	- Índice Lugar 1/Lugar 2 - Con otras áreas: lugar de atención (reporte del caso) - Lugar de residencia	- 0= IPS 1 - 1= IPS n - Etc...	Relación de equivalencia (número asignado)	No paramétrica	- Frecuencias - Porcentajes - Chi Cuadrado - Regresión logística simple y múltiple