**CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA:
COMPARACIÓN ENTRE ADULTOS MENORES Y MAYORES DE 65 AÑOS**

Ángela María Torres Bustamante, MD

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Facultad de Salud

Escuela de Medicina

Departamento de Medicina Interna

Floridablanca

2020

**CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA:
COMPARACIÓN ENTRE ADULTOS MENORES Y MAYORES DE 65 AÑOS**

Presentado por:

Ángela María Torres Bustamante, MD

Residente de Medicina Interna

**Trabajo de Investigación para optar por el título de Especialista en Medicina
Interna**

Director de proyecto de grado:

Juan Fernando Carvajal Estupiñán

Médico especialista en Medicina Interna, Cardiología e Insuficiencia Cardíaca

Docente de posgrado UNAB

Codirector de proyecto y asesor epidemiológico:

Miguel Enrique Ochoa Vera

Médico, Magíster en Epidemiología, grupo de investigaciones clínicas UNAB

Docente de pregrado y posgrado UNAB

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Facultad de Salud

Escuela de Medicina

Departamento de Medicina Interna

Floridablanca

2020

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Floridablanca, Junio de 2020

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi gratitud a todos los que hicieron posible el desarrollo de este trabajo en especial a:

- Dr Juan Fernando Carvajal Estupiñán, un excelente profesional y persona. Mi director de proyecto, mi maestro y mi guía.

- Dra Mariana Torres, mi hermana. Por su colaboración activa en el desarrollo de este proyecto y en el análisis de datos.

- A todos mis profesores, por sus enseñanzas, por hacer parte vital en mi proceso de aprendizaje, por ser un ejemplo a seguir en lo profesional y en lo humano.

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi guía en cada paso que doy, mi horizonte y mi soporte espiritual.

A mis padres: Francelly Bustamante e Isnardo Torres, por darme la vida, por su apoyo incondicional, por sus enseñanzas, por su amor, por su entrega y sacrificio. Por ser la parte más importante de mi vida. Todo lo que he logrado es para ustedes.

A mi hermana Mariana, por ser mi compañera de aventuras desde que nací, mi consejera y la mejor hermana que Dios me pudo dar.

TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE GRÁFICAS	10
RESUMEN	11
INTRODUCCIÓN	13
1.1 Objetivo general	14
1.2 Objetivos específicos	14
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE	16
3.1 Definición insuficiencia cardiaca	16
3.2 Clasificación de la insuficiencia cardiaca	17
3.3 Epidemiología.....	19
3.4 Fisiopatología de la insuficiencia cardiaca	21
3.5 Etiología de la insuficiencia cardiaca	22
3.6 Características de la insuficiencia cardiaca en adultos jóvenes vs adultos mayores	23
3.7 Calidad de vida relacionada con la salud en adultos jóvenes vs adultos mayores	25
3.9 Escalas para evaluar calidad de vida en insuficiencia cardiaca	26
4. METODOLOGÍA	28
4.1 Tipo y diseño general del estudio:	28
4.2 Lugar:	28
4.3 Población:	28
4.4 Criterios de inclusión:	28
4. 5 Criterios de exclusión:.....	28
4.6 Cálculo del tamaño de muestra.....	28
4.7 Plan de recolección de información	28
4.8 Control de calidad de los datos	29
4.9 Monitoreo de los Datos.....	29
4.11 Variables	30
4.12 Análisis estadístico	38
5. ASPECTOS ÉTICOS	40
6. RESULTADOS	41
6.1 Análisis univariado de características generales	41

6.2 Análisis univariado calidad de vida	46
6.3 Análisis bivariado de características generales $\leq$ 65 años vs mayores de 65 años.	48
6.4 Análisis bivariado calidad de vida $\leq$ 65 años vs mayores de 65 años.....	54
6.5 Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida.....	58
7. DISCUSIÓN	59
8. CONCLUSIÓN	64
ANEXO 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	65
ANEXO 2. CUESTIONARIO KANSAS CITY	68
BIBLIOGRAFÍA	71

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación insuficiencia cardiaca según fracción de eyección	16
Tabla 2. Estadios de la insuficiencia cardiaca ACCF/AHA. Adaptado de las Guías para el manejo de insuficiencia cardiaca ACCF/AHA 2013.....	18
Tabla 3. Clasificación de clase funcional según NYHA. Adaptado de las Guías para el manejo de insuficiencia cardiaca ACCF/AHA 2013	18
Tabla 4. Causas de insuficiencia cardiaca. Adaptado del Consenso Colombiano para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica	23
Tabla 5. Definición de variables	30
Tabla 6. Análisis univariado: Características clínicas y demográficas	42
Tabla 7. Análisis univariado calidad de vida.....	46
Tabla 8. Análisis bivariado características demográficas y clínicas ≤ 65 años vs >65 años.....	49
Tabla 9. Análisis bivariado características ecocardiográficas y medicamentos en ≤ 65 años vs >65 años.....	51
Tabla 10. Análisis bivariado calidad de vida ≤ 65 años vs mayores de 65 años....	54
Tabla 11. Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida.....	58

LISTADO DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Tipos de cardiopatía en la población general n=166.....	45
Gráfica 2. Comorbilidades más frecuentes en la población general n=166	45
Gráfica 3. Frecuencia absoluta de tipos de cardiopatía según la edad ≤ 65 años vs mayores de 65 años	52
Gráfica 4. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo según la edad	53
Gráfica 5. Disfunción diastólica según la edad	53
Gráfica 6. Frecuencia de absoluta de síntomas totales	56
Gráfica 7. Frecuencia de absoluta del resumen clínico	56
Gráfica 8. Frecuencia de absoluta del resumen general.....	57
Gráfica 9. Gráfico de cajas y bigotes resumen general según la edad.....	57

RESUMEN

Introducción: La insuficiencia cardiaca afecta negativamente la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La mayoría de estudios en esta población se han centrado en adultos mayores, por lo que hay pocos datos que describan las características clínicas y la calidad de vida en pacientes jóvenes. El objetivo principal de esta investigación fue comparar la calidad de vida atribuible a insuficiencia cardiaca estimada con la escala de *Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire*, entre pacientes con insuficiencia cardiaca de 18 a 65 años vs mayores de 65 años.

Métodos: Estudio observacional analítico de corte transversal, realizado en la consulta externa del Instituto del Corazon de Bucaramang, en pacientes $\geq$ de 18 años con insuficiencia cardiaca. Se realizó un análisis descriptivo univariado de las variables demográficas y clínicas, incluyendo comorbilidades, exámenes de laboratorio y variables ecocardiográficas. Adicionalmente, se aplicó la encuesta de calidad de vida para insuficiencia cardiaca *Kansas city*. Se determinaron las diferencias entre edad ($\leq$ 65 años o $>$ 65 años), y las diferentes variables clínicas independientes cuantitativas y cualitativas. Finalmente, se evaluó la asociación entre la variable desenlace deterioro de calidad de vida (puntaje de resumen *Kansas* entre 0 – 49,9), con las variables clínicas independientes. Se aceptó la significación estadística con un valor $p < 0.05$.

Resultados: Se incluyeron 166 participantes (82 $\leq$ 65 años y 84 $>$ 65 años). La mediana de edad fue 66 años (RIQ: 58 - 73). El 58% de los pacientes eran de género masculino. Las 3 cardiopatías más frecuentes fueron: isquémica (36,1%), idiopática (28,3%) y chagásica (19,9%). Las comorbilidades más frecuentes fueron: enfermedad renal crónica (50%), hipertensión arterial (42,8%), infarto agudo del miocardio (37%) y fibrilación auricular (29,5%). Las medianas de los puntajes de resumen de la escala de Kansas fueron: Resumen de síntomas total 80 (RIQ: 57,5 – 93,3), resumen clínico 77,7 (RIQ: 59,1 – 91,6) y resumen general 72,7 (RIQ: 55,7 – 84,7). La mayoría de los participantes presentaron una excelente calidad de vida en los dominios evaluados. No hubo diferencias estadísticamente significativas determinadas por la edad en los puntajes de calidad de vida. Los dominios con mayor afectación en ambos grupos fueron calidad de vida y estabilidad de los síntomas. La presencia de 1 o más hospitalizaciones en el último

año a causa de IC y la clase funcional NYHA III-IV, estuvieron asociadas a peor calidad de vida en el resumen general ($p=0,01$ y $p<0,001$, respectivamente). Adicionalmente, el antecedente de accidente cerebro vascular se asocia a una peor calidad de vida en el puntaje de síntomas totales ($p=0,028$).

Conclusión: No hay diferencias estadísticamente significativas en la CVRS, determinadas por la edad estratificada en ≤ 65 años y > 65 años. La mayor parte de los pacientes tuvieron una excelente calidad de vida en todos los dominios evaluados y en los puntajes de resumen medidos por la escala de *Kansas city*. Los 3 predictores clínicos asociados a peor CVRS fueron hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, clase funcional NYHA III-IV y antecedente de accidente cerebrovascular. La evaluación del paciente mediante escalas de calidad de vida cobra vital importancia en el abordaje integral de la insuficiencia cardíaca, además proporciona información que no puede ser extrapolada de otras mediciones clínicas funcionales.

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca; Calidad de vida.

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad crónica y progresiva, cuya prevalencia e incidencia han aumentado dramáticamente en los últimos años (1). A pesar de los avances sustanciales en su tratamiento, la morbilidad y la mortalidad siguen siendo altas, y aproximadamente el 40% de los pacientes mueren en el primer año después de su primera hospitalización (2,3).

Los pacientes con IC sufren una gran carga de síntomas más allá de las manifestaciones típicas de la enfermedad, lo que afecta la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La falta de un interrogatorio y una exploración adecuada, producen un subdiagnóstico del deterioro en los ámbitos físicos, mentales y sociales de los pacientes.

Dado que la incidencia de IC aumenta notoriamente con la edad (4), la mayoría de estudios en la población se han centrado en adultos mayores. Por lo que hay pocos datos que describan los síntomas y la CVRS en los pacientes jóvenes, grupo de gran importancia y con posibilidad de intervenciones terapéuticas más avanzadas.

Se ha reportado que los pacientes más jóvenes tienen peor CVRS, y esto probablemente refleja el mayor impacto de los síntomas de la IC. Teniendo en cuenta la limitación funcional en un grupo de edad que es más activo o desea ser más activo, para satisfacer las demandas de empleo, familiares y sociales (5).

Para propósitos de esta investigación, se evaluó de forma independiente el impacto de la funcionalidad y los síntomas, en las percepciones de la calidad de vida de los pacientes. Describiendo las características demográficas de la población y sus comorbilidades, y caracterizando la CVRS en sus diferentes dominios según la escala *de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire*. Así mismo, se establecieron asociaciones entre la edad, factores clínicos y el deterioro de la calidad de vida en IC.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Comparar la calidad de vida atribuible a insuficiencia cardiaca estimada con la escala de *Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire*, entre pacientes de 18 a 65 años vs mayores de 65 años, que asistan al servicio de consulta externa de la unidad funcional de insuficiencia cardiaca del Instituto del Corazón de Bucaramanga en el periodo comprendido entre agosto de 2019 a marzo de 2020.

1.2 Objetivos específicos

Describir las características de la población en términos de edad, género y comorbilidades.

Caracterizar la calidad de vida medida por la escala de *Kansas city Cardiomyopathy Questionnaire* en la totalidad de la muestra.

Evaluar la asociación entre la edad y el compromiso de la calidad de vida en Insuficiencia Cardiaca según la escala de *Kansas city*.

Identificar factores clínicos asociados a la calidad de vida en Insuficiencia Cardiaca según la escala de *Kansas city*.

2. JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Colombia, siendo la IC una de las principales contribuyentes (6). La prevalencia estimada de IC en el país es de aproximadamente 2,3%, lo que se traduce en cerca de 1'144.270 personas afectadas (7). Adicionalmente, en los últimos 20 años las hospitalizaciones a causa de esta patología se han triplicado, con un efecto deletéreo en los dominios físicos y mentales de los pacientes, e influyendo en la progresión de la enfermedad (4).

El impacto significativo de la IC magnifica la necesidad de mejorar la comprensión de los resultados centrados en el paciente, incluido el estado funcional y la CVRS. Mientras que las medidas funcionales (por ejemplo, la clasificación de la New York Heart Association o las distancias de caminata de 6 minutos) reflejan las capacidades físicas del paciente, la CVRS representa la diferencia entre el nivel de función real y el esperado del paciente (8). Explorando los efectos de la IC en la vida diaria, y por lo tanto proporcionando información que no puede ser extrapolada de otras mediciones clínicas (9,10).

Mejorar la calidad de vida es el objetivo más importante en el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. El estudio SHAPE, realizado en 10 países europeos, demostró que la mayoría de la población prefiere una mejor CVRS, en comparación con los años de supervivencia (11).

Dada la carga global de la IC, su aumento proyectado a lo largo del tiempo y la falta de terapias modificadoras de la enfermedad . Una caracterización más completa de la CVRS como punto final, es necesaria.

Además, una mayor comprensión de las características clínicas, ecocardiográficas, y la calidad de vida en pacientes jóvenes es de particular importancia, permitiendo establecer cuáles son los principales problemas y áreas a intervenir en dichos pacientes, y de esta manera plantear estrategias para poder brindar un tratamiento oportuno y mejorar su calidad de vida.

3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

3.1 Definición insuficiencia cardiaca

La insuficiencia cardíaca (IC) se define como una anomalía en la estructura o función cardíaca, que conduce a una insuficiencia del corazón para entregar el oxígeno a un ritmo acorde a la demanda de los tejidos, a pesar de presiones de llenado normales (o sólo a expensas de un aumento de las presiones de llenado) (12).

Clínicamente es un síndrome caracterizado por síntomas típicos (por ejemplo, dificultad para respirar, edema de los tobillos, y fatiga) y signos (por ejemplo, presión venosa yugular elevada, estertores pulmonares, y latido apical desplazado) como resultado de una anomalía estructural o funcional cardíaca. Debido a que algunos pacientes se presentan sin signos o síntomas de sobrecarga de volumen, el término "insuficiencia cardíaca" es preferible a "la insuficiencia cardíaca congestiva". El diagnóstico de la IC puede ser difícil. Muchos de los síntomas no son discriminatorios y, por tanto, de valor diagnóstico limitado. Demostrar una causa cardíaca subyacente, es fundamental para el diagnóstico de IC. En la tabla 1 se presenta la clasificación de la IC según la fracción de eyección (FE). (12).

Tabla 1. Clasificación insuficiencia cardiaca según fracción de eyección.

Clasificación	Fracción de eyección	Descripción
I. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida	≤ 40%	También se conoce como insuficiencia cardíaca sistólica. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados han involucrado principalmente pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y sólo en estos pacientes se han demostrado tratamientos eficaces.

II. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada	≥50%	También se conoce como insuficiencia cardiaca diastólica. Se han utilizado diversos criterios para definirla. El diagnóstico es un reto. No se han identificado terapias eficaces hasta la fecha.
<i>a. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada borderline</i>	41-49%	Estos pacientes se dividen en un grupo marginal o intermedio. Sus características, los patrones de tratamiento y los resultados parecen similares a los de los pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.
<i>b. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección recuperada</i>	>40	Se ha reconocido que un subconjunto de pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada previamente tenían fracción de eyección reducida. Estos pacientes con mejoría o recuperación de la fracción de eyección, pueden ser clínicamente distintos de aquellos con fracción de eyección persistentemente conservada o reducida. Se necesitan más investigaciones para caracterizar mejor estos pacientes

Adaptado de las Guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica 2016.

3.2 Clasificación de la insuficiencia cardiaca

La clasificación de la ACC/AHA (Tabla 2), tiene en cuenta los factores de riesgo y las anomalías de la estructura cardiaca, asociados con síntomas de insuficiencia cardiaca. Los estadios son progresivos e inviolables. Una vez el paciente incrementa de estadio, no hay regresión a un estadio más temprano. La progresión está relacionada con el incremento de las concentraciones de péptido natriurético y con una disminución en la supervivencia a 5 años (13). Las intervenciones terapéuticas en cada estadio pretenden modificar factores de riesgo en el estadio A, tratar enfermedad estructural cardiaca en el estadio B, y reducir morbilidad y mortalidad en el estadio C y D (14).

La clasificación NYHA (Tabla 3) involucra la severidad de los síntomas en aquellos con enfermedad estructural cardíaca (Estadio C y D). Esta es una evaluación subjetiva que puede cambiar en cortos periodos de tiempo (14).

Tabla 2. Estadios de la insuficiencia cardíaca ACCF/AHA. Adaptado de las Guías para el manejo de insuficiencia cardíaca ACCF/AHA 2013

ESTADIOS DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA SEGÚN ACCF/AHA	
A	Alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad estructural cardíaca, ni síntomas de insuficiencia cardíaca.
B	Enfermedad estructural cardíaca pero sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca.
C	Enfermedad estructural cardíaca, con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca
D	Insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervención especializada.

Tabla 3. Clasificación de clase funcional según NYHA. Adaptado de las Guías para el manejo de insuficiencia cardíaca ACCF/AHA 2013

CLASIFICACIÓN DE CLASE FUNCIONAL SEGÚN DE NYHA	
I	No hay limitación para la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas de insuficiencia cardíaca.
II	Leve limitación para la actividad física. Sin síntomas al reposo, pero la actividad física ordinaria resulta en síntomas de insuficiencia cardíaca.
III	Marcada limitación para la actividad física. Sin síntomas al reposo, pero la actividad física mínima produce síntomas de insuficiencia cardíaca
IV	Incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad física. Se presentan síntomas en reposo y aumentan con cualquier actividad física.

3.3 Epidemiología

La prevalencia de IC es de aproximadamente 1-2% de la población adulta en los países desarrollados, llegando a más del 10% en personas de 70 años (15). Se prevé que la prevalencia en los Estados Unidos aumentará en las próximas cuatro décadas, con un estimado de 772,000 nuevos casos de insuficiencia cardíaca proyectados en el año 2040 (16). Estos datos deben interpretarse con cautela debido a la introducción de una nuevas metodologías de diagnóstico, mayor conciencia de la enfermedad y cambios en la prevalencia de las comorbilidades.

Los estudios han demostrado que la prevalencia de disfunción del ventrículo izquierdo aumenta considerablemente con la edad. Como ejemplo, el Estudio del corazón de Framingham encontró una prevalencia de insuficiencia cardíaca en hombres de 8 por 1000 a la edad de 50 a 59 años, aumentando a 66 por 1000 a la edad de 80 a 89 años; Se observaron valores similares en mujeres (8 y 79 por cada 1000, respectivamente) (17).

La incidencia de la IC, al igual que la prevalencia, aumenta con la edad (8). En el estudio de Framingham, la incidencia se duplicó aproximadamente en cada década sucesiva de la vida. En hombres aumentó de 2 por 1000 a la edad de 45 a 54 años, a 9 por 1000 a la edad de 65 a 74 años. En las mujeres, aumentó de 1 por 1000 a la edad de 45 a 54 años, a 6 por 1000 a la edad de 65 a 74 años.

En Colombia, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Para el período 2000-2010, la mortalidad de origen cardiovascular en hombres se estimó en 136 por 100.00 personas, mientras en mujeres de 125 por 100.000 personas, fenómeno en el que la insuficiencia cardíaca fue uno de los contribuyentes principales. En 2012, según datos del Ministerio de salud y protección social, la prevalencia de la enfermedad en la población general era de un 2,3%; de éstos un 59,7% son hombres y un 40,3% mujeres (18).

La mortalidad por insuficiencia cardíaca depende de la severidad, la etiología, el tratamiento, el momento de la detección y la población evaluada. La mortalidad a cinco años según el estadio de la enfermedad va desde 3% en estadio A, 4% en estadio B, 25% en estadio C y hasta de un 80% en estadio D. De igual forma, el pronóstico puede verse sustancialmente modificado mediante intervenciones médicas, uso de dispositivos y trasplante de corazón (18).

3.3.1 Epidemiología de la insuficiencia cardíaca en adultos jóvenes vs adultos mayores

En un análisis del estudio de Framingham de 10,311 sujetos, no se encontraron cambios en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad en hombres entre el período de 1950 a 1969 y el período de 1990 a 1999 (19). Entre las mujeres, hubo una disminución en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad entre los períodos de tiempo de 1950 a 1969 y de 1970 a 1979, y no hubo cambios posteriores en el período de 1990 a 1999. La edad media en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aumentó de 63 años en el período de 1950 a 1969 a 80 años en el período de 1990 a 1999.

De manera similar, un informe de la Clínica Mayo basado en 4537 individuos con insuficiencia cardíaca incidente (edad media de 74 años) no encontró evidencia de ningún cambio significativo en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad para hombres o mujeres entre 1979 y 2000 (20).

En contraste, un estudio retrospectivo en individuos ≥ 65 años encontró un aumento del 14% en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad en el período comprendido entre 1970 y 1974 y 1990 y 1994(21).

Hay menos datos disponibles sobre la incidencia de insuficiencia cardíaca en los adultos más jóvenes. En el estudio de Framingham, el riesgo a cinco años de insuficiencia cardíaca entre los blancos de 40 años fue de 0,1 a 0,2% (22).

La raza parece jugar un papel determinante en el desarrollo de IC. Un informe del estudio CARDIA de 5115 sujetos (52% de raza negra; 48 % blancos) de 18 a 30 años de edad que fueron seguidos prospectivamente durante 20 años encontró que el incidente de IC antes de los 50 años de edad es sustancialmente más común entre los negros que entre los blancos (1.1% , 0.9 % , 0.08% y 0% en mujeres negras, hombres negros, mujeres blancas y hombres blancos, respectivamente (23).

Un informe del estudio CHARM encontró que el 18% de los pacientes con insuficiencia cardíaca de 20 a 39 años eran negros en comparación con el 2% ≥ 70 años (24). Entre los negros, los predictores independientes de insuficiencia cardíaca antes de los 30 años eran una presión arterial diastólica más alta, un índice de masa corporal alto, LDL y la presencia de enfermedad renal.

3.4 Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca

En pacientes con disfunción sistólica del VI, los cambios desadaptativos que ocurren en los miocitos y la matriz extracelular después de la lesión miocárdica (por ejemplo, infarto de miocardio) conducen a una “remodelación” patológica del ventrículo con dilatación y alteración de la contractilidad. Estos cambios empeoran con el tiempo.

Se piensa que hay dos mecanismos como causa de esta progresión. El primero es la aparición de nuevos eventos que llevan a la muerte de miocitos adicionales (por ejemplo, infarto de miocardio recurrente). El otro es la respuesta sistémica inducida por el deterioro de la función sistólica y la activación neurohormonal (12).

En la IC se activan dos sistemas neurohormonales: El sistema renina-angiotensina - aldosterona y el sistema nervioso simpático. Además de causar más daño miocárdico, estas respuestas sistémicas tienen efectos perjudiciales en los vasos sanguíneos, los riñones, los músculos, la médula ósea, los pulmones y el hígado, creando un “círculo

vicioso". La interrupción de estos dos procesos claves son la base del tratamiento de la IC.

Clínicamente, los cambios antes mencionados están asociados con el desarrollo de los síntomas y el empeoramiento de estos con el tiempo, dando lugar a disminución de la calidad de vida, la disminución de la capacidad funcional, los episodios de descompensación que conducen al ingreso hospitalario y la muerte prematura, por lo general debido a la falla de la bomba o una arritmia ventricular(25).

La reserva cardíaca limitada de estos pacientes también depende de la contracción auricular, la contracción sincronizada del ventrículo izquierdo, y una interacción normal entre ambos ventrículos(26,27).

3.5 Etiología de la insuficiencia cardíaca

Existen muchas causas de IC, las cuales varían en diferentes partes del mundo (Tabla 4). La enfermedad arterial coronaria es la causa de aproximadamente dos tercios de los casos de IC sistólica, aunque la hipertensión y la diabetes son factores que también contribuyen en muchos casos. En el estudio Framingham, durante cuatro décadas de observación, la prevalencia de enfermedad coronaria como causa de insuficiencia cardíaca aumentó 41% por década en hombres y 25% en mujeres. La prevalencia de diabetes como causa contribuyente aumentó en más del 20% (28).

La primera Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES I) de 13,643 hombres y mujeres (29), que fueron seguidos durante 19 años encontró que los factores de riesgo para la IC fueron los siguientes: Enfermedad coronaria (Riesgo relativo (RR): 8,1), tabaquismo (RR: 1,6), hipertensión arterial (RR: 1,4), obesidad (RR: 1,3), diabetes (RR: 1,5), valvulopatía (RR: 1,5).

Hay otras causas de IC sistólica que incluyen infección previa viral (reconocida o no reconocida), el abuso del alcohol, la quimioterapia (por ejemplo, doxorubicina o trastuzumab) y la miocardiopatía dilatada 'idiopática' (aunque se cree que la causa es desconocida, algunos de estos casos pueden tener una base genética) (12).

En una evaluación de 1230 pacientes con una miocardiopatía inicialmente inexplicada (30), se observaron las siguientes etiologías: Idiopático: 50%, miocarditis: 9%, isquémica: 7%, enfermedad infiltrativa 5%, miocardiopatía periparto 4%, hipertensión 4%, VIH 4%, enfermedad del tejido conectivo 3%, abuso de sustancias 3%, doxorubicina 1%.

Tabla 4. Causas de insuficiencia cardiaca. Adaptado del Consenso Colombiano para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica.

ISQUÉMICA
NO ISQUÉMICA
MIOCARDIOPATÍAS
a. Familiares: hipertrófica, dilatada, restrictiva, cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo no compactado
b. Adquirida
Miocarditis
1. Infecciosas: bacterias, espiroquetas, hongos, protozoos, parásitos (enfermedad de Chagas), rickettsias, virus.
2. Inmunomediada: toxoide tetánico, medicamentos, miocarditis de células gigantes, sarcoidosis, enfermedades autoinmunes, eosinofilia
3. Tóxica: quimioterapia, cocaína, alcohol, metales pesados.
4. Endocrina: feocromocitoma, deficiencia de tiamina, selenio, hipofosfatemia, hipocalcemia
5. Periparto
6. Infiltrativa: amiloidosis, hemocromatosis, malignidad.
c. Enfermedades valvulares
d. Enfermedades del pericardio
e. Enfermedades endocárdicas: síndrome hipereosinofílico, fibrosis endomiocárdica, fibroelastosis endomiocárdica.
f. Enfermedades congénitas cardiacas
g. Alteraciones del ritmo cardiaco: taquicardiomiopatías
h. Estado de alto gasto e hiperdinamia: sepsis, anemia, tirotoxicosis, enfermedad de Paget, fístula arteriovenosa.
i. Sobrecarga de volumen: enfermedad renal, iatrogénica

3.6 Características de la insuficiencia cardiaca en adultos jóvenes vs adultos mayores

En el estudio CHARM y otros estudios, evidenciaron que había una mayor proporción de pacientes más jóvenes cuya etiología de la IC era idiopática (y una menor proporción

de etiología isquémica). La incidencia y la prevalencia de cardiomiopatía dilatada de etiología idiopática aumentan constantemente con la edad en la población general. Sin embargo, la incidencia y la prevalencia de las 2 etiologías alternativas más comunes (isquemia e hipertensión) aumentan aún más rápidamente con la edad, lo que disminuye la frecuencia relativa de la idiopática en pacientes con un diagnóstico establecido de IC (24,31).

En el estudio CHARM, la fibrilación auricular fue significativamente menos común en los pacientes más jóvenes (13% frente a 36%) (24). Las tasas de hospitalización a 3 años fueron de 24%, 15%, 15%, 22% y 28% en las edades de 20 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 años, respectivamente.

Adicionalmente, en dicho estudio se documentó que los pacientes más jóvenes tenían más probabilidades de presentar disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna en el momento de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en comparación con los adultos mayores. Sin embargo, los signos clínicos como el edema pulmonar y los signos radiológicos de la insuficiencia cardíaca, fueron menos frecuentes en el grupo etáreo más joven.

Se piensa que los factores del estilo de vida contribuyen a la mayor tasa de hospitalizaciones por IC en pacientes más jóvenes, que tenían de 2 a 3 veces menos probabilidades de adherirse a sus medicamentos y restricciones dietéticas. Al comparar a los pacientes más jóvenes (20 a 39 años) con los pacientes mayores (70 años), la falta de adherencia a la medicación fue del 24% frente al 7% ($p < 0.001$), la adherencia a la dieta fue del 21% frente al 9% ($p < 0.002$), y el exceso de alcohol informado fue del 3% frente al 1% ($p < 0.0001$). No se observaron diferencias significativas entre los grupos de edad en el tratamiento agudo con diuréticos intravenosos, inotrópicos o vasodilatadores. La mortalidad bruta por cualquier causa a los 3 años fue más baja en el grupo de edad más joven y aumentó con la edad, aunque solo marcadamente por encima de los 60 años (12%, <40 años; 13%, 40 a 49 años; 13%, 50 a 59 años; 19%, 60 a 69 años, y 31%, 70 años; $p < 0.0001$) (24).

3.7 Calidad de vida relacionada con la salud en adultos jóvenes vs adultos mayores

Se ha reportado que los pacientes más jóvenes tienen peor CVRS y probablemente refleja el mayor impacto de los síntomas de insuficiencia cardíaca y la limitación funcional en un grupo de edad que es más activo (o desea ser más activo) para satisfacer las demandas de empleo, familiares y sociales (5,32) . Además se ha observado una diferencia en los síntomas entre pacientes más jóvenes vs los mayores durante los episodios de descompensación, siendo más sintomáticos los pacientes más jóvenes (24). Estudios previos, han documentado una mayor prevalencia de depresión en los pacientes más jóvenes, afectando los cuestionarios que miden la calidad de vida (32).

En un estudio realizado en el 2004 (5), donde compararon CVRS en dos grupos etáreos (menores vs mayores de 65 años), al inicio del estudio los pacientes mayores tenían mejor CVRS que los pacientes más jóvenes (puntuación Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire media 60 ± 25 versus 54 ± 28 , $p = 0.005$). Sin embargo, esto no se vió reflejado en las medidas funcionales, donde los adultos mayores tenían peor clase funcional medida por NYHA (media 2.54 versus 2.35, $p = 0.001$) y menores distancias de caminata de 6 minutos (824 versus 1064, $p = 0.001$). Después del ajuste multivariable, la edad avanzada se correlacionó de forma independiente con una mejor CVRS.

En el seguimiento, los pacientes mayores, con un deterioro en la clase funcional NYHA, experimentaron disminuciones marcadas en la CVRS en comparación con los pacientes más jóvenes (cambio promedio en la CVRS de 14,4 puntos frente a 0,3 puntos, respectivamente, $p = 0.001$). Los análisis con una distancia de caminata de 6 minutos como la medida funcional dieron resultados similares (5)

3.8 Determinantes de calidad de vida

Una cohorte de 661 pacientes encontró que los pacientes con peor calidad de vida en IC, tenían una clase funcional NYHA III-IV, niveles más altos de BNP, niveles más bajos de sodio, presión arterial diastólica más baja, tasas de filtración glomerular más bajas, y

tenían como comorbilidades asociadas como: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y accidente cerebrovascular (33).

Adicionalmente, la evidencia reciente sugiere que la deficiencia de hierro en pacientes con IC, puede estar asociada con una capacidad de ejercicio deteriorada, una enfermedad más grave y desenlaces clínicos más pobres. Además la CVRS, se vio afectada negativamente en pacientes con déficit de hierro, independiente de la anemia, y este deterioro se reflejó principalmente a elementos del dominio físico, en lugar del dominio emocional (34).

3.9 Escalas para evaluar calidad de vida en insuficiencia cardiaca

La CVRS generalmente se acepta como una evaluación multidimensional, de cómo la enfermedad y el tratamiento afectan la función general y el bienestar del paciente. La FDA define oficialmente la CVRS como "un concepto multidominio que representa la percepción general del paciente sobre el efecto de la enfermedad y el tratamiento en los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la vida" (35).

Hasta la fecha se han desarrollado diversos cuestionarios específicos para valorar la CVRS en pacientes con IC. Los cuestionarios *Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)* y el *Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ)*, son dos de los cuestionarios más utilizados y validados para evaluar la calidad de vida específica de la IC. Además de caracterizar la carga de síntomas del paciente, estos cuestionarios también predicen resultados clínicos, como las hospitalizaciones, la progresión de la insuficiencia cardíaca y la muerte (36)

En una cohorte prospectiva de 667 sujetos con IC, se comparó el valor pronóstico de las escala KCCQ vs MLHFQ. En general, KCCQ fue superior a MLHFQ para predecir muerte, trasplante e implantación de dispositivos de asistencia ventricular ($p < 0.001$) y hospitalizaciones por IC ($p = 0.022$). Cuando se analizó el valor pronóstico adicional al agregar MLHFQ a KCCQ en los grupos generales, no hubo una mejora significativa en cuanto a predicción de los desenlaces clínicos.

El KCCQ es un instrumento reciente, que además de valorar las dimensiones clásicas (física, síntomas e interferencia social), incorpora una valoración de los cambios en los síntomas y del nivel de autocuidado de dichos pacientes (37). Es un instrumento autoaplicable de CVRS específico para IC, compuesto por 23 ítems que componen siete dimensiones: Limitación física (6 ítems), estabilidad de los síntomas (1 ítem), frecuencia de los síntomas (4 ítems), severidad de los síntomas (3 ítems), autoeficacia (2 ítems), calidad de vida (3 ítems) y interferencia social (4 ítems). Las respuestas de los ítems se codifican secuencialmente (1, 2, 3, etc.) de las peores al mejor estado. El puntaje para cada dominio se calcula de la siguiente manera: puntaje obtenido menos el valor mínimo posible, dividido en el rango del dominio, multiplicado por 100. Las puntuaciones se generan para cada dominio desde 0 a 100, correspondiendo 0 al peor estado y 100 el mejor estado posible.

Además, se calculan varios puntajes de resumen: un puntaje total de síntomas. (promedio de la frecuencia de los síntomas y la carga de los síntomas), sumario clínico (promedio de limitación física y síntomas totales), y un puntaje de resumen general (promedio de limitación física, síntomas, calidad de vida e interferencia social). Además se puede estratificar de la siguiente manera: pobre calidad de vida un puntaje de 0-24, calidad de vida regular 25-49, buena calidad de vida 50 – 74 y excelente calidad de vida 75-100 (37,38).

Este cuestionario fue validado a la versión española en el 2010, demostrando que es un cuestionario específico de calidad de vida para pacientes con IC, con unas adecuadas propiedades métricas, paralelas a las de la versión original, y una excelente validez y fiabilidad del constructo. Constituyendo una herramienta óptima para su uso en pacientes con IC, y permitiendo la comparación internacional del nivel de CVRS específica para la IC(39).

4. METODOLOGÍA

4.1 Tipo y diseño general del estudio: Observacional analítico de corte transversal.

4.2 Lugar: Servicio de consulta externa Instituto del Corazon – Bucaramanga, Santander.

4.3 Población: Adultos $\geq$ de 18 años con diagnóstico de insuficiencia cardiaca que asistan al servicio de consulta externa de cardiología: Unidad funcional de insuficiencia cardiaca, del instituto del corazón de Bucaramanga.

4.4 Criterios de inclusión:

■ Edad: 18 años o más

■ Diagnóstico de insuficiencia cardiaca que asistan a la consulta externa de cardiología: Unidad funcional de insuficiencia cardiaca, del Instituto del Corazón de Bucaramanga.

4. 5 Criterios de exclusión:

■ No deseo de participar en el estudio

■ Incapacidad para valorar y diligenciar el cuestionario

■ Pacientes portadores de asistencias ventriculares

■ Pacientes con trasplante cardiaco

4.6 Cálculo del tamaño de muestra:

Para un poder del 80% y un nivel de significancia de 0.05, asumiendo una prevalencia de baja calidad de vida en el grupo 1 (pacientes jóvenes) del 45% y una prevalencia en el grupo 2 del 21,3% (40). Con una razón grupo 2 /grupo1 de 1:1. Se calculó un tamaño de muestra total mínimo de 122 pacientes

4.7 Plan de recolección de información:

Los pacientes fueron invitados a través de entrevista personal. Una vez verificado los criterios de inclusión y exclusión, se procedió a firmar el consentimiento informado a

aquellos pacientes que aceptaron participar en el estudio. Posteriormente el personal previamente capacitado y entrenado (cardiólogo tratante y residente de medicina interna), realizó una encuesta, examen físico, revisión de exámenes (ecocardiogramas, electrocardiograma y exámenes de laboratorio). Además se aplicó el cuestionario de calidad de vida *Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire*, acompañando al paciente para la adecuada interpretación y diligenciamiento del mismo. El manejo médico (diagnóstico, tratamiento y seguimiento) no se afectó en ninguna forma.

4.8 Control de calidad de los datos

Una vez que los pacientes aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento informado, cada participante fue identificado con un código no ligante. Los datos recolectados se registraron en un formato de encuesta previamente diseñado para fines de este estudio. El personal encargado de la recolección de información se encontraba previamente capacitado.

4.9 Monitoreo de los Datos

Todos los datos recolectados fueron revisados por un supervisor (epidemiólogo) , con el fin de monitorear la recolección de información y garantizar que todas las encuestas estuvieran totalmente diligenciadas, realizando las correcciones necesarias. El grupo investigador y los encuestadores se reunieron mensualmente para verificar el diligenciamiento completo de instrumentos, resolver inquietudes y retroalimentar la recolección de la información.

4.10 Manejo de los Datos

Una vez diligenciado el formato de recolección de datos, la información fue transcrita a una base de excel por duplicado usando un código binario. Las inconsistencias de los datos fueron corroboradas en la fuente la primaria. Posteriormente, la base de datos se analizó en el programa STATA 13.

4.11 Variables

Variables independientes

Tabla 5. Definición de variables

VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO	MEDICIÓN	INDICADOR	OBSERVACIÓN
Edad	Cantidad de años cumplidos determinada por la fecha de nacimiento	Cuantitativa continua	Continua	años	Mayores de 18 años
Edad estratificada	Pacientes ≤ 65 años y >65 años	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal	años	0. ≤ 65 años 1. > 65 años
Género	Fenotipo	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		Masculino: 0 Femenino: 1
Área urbana/rural	Con base en la procedencia	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		Urbana: 0 Rural: 1
Número de consultas en el último año	Número de consultas en la unidad funcional de insuficiencia cardíaca en el último año	Cuantitativa discreta	Continua	años	
Hospitalizaciones	Hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el último año.	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No hospitalizaciones 1. Una o más hospitalizaciones
Fecha de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca	Fecha en que se hizo por primera vez un diagnóstico médico de insuficiencia cardíaca según lo registrado en la historia clínica	Cuantitativa continua	Continua	año	
Fecha de la primera consulta	Fecha de la primera consulta en la unidad funcional de insuficiencia cardíaca	Cuantitativa continua	Continua	año	
Fecha de la última consulta	Fecha de la primera consulta a la unidad funcional de insuficiencia cardíaca	Cuantitativa continua	Continua	año	
Tipo de cardiopatía	Etiología de la insuficiencia cardíaca	Cualitativa nominal politómica	Nominal		1. Isquémica 2. Chagásica 3. Valvular 4. Idiopática 5. Hipertensiva 6. Otras

Antecedente DM	Según registro en la historia clínica.	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente HTA	Según registro en la historia clínica.	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente de Enfermedad renal crónica	TFG < 60 ml/min por más de 3 meses, calculada por Cockcroft - Gault	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
TFG	Tasa de filtración glomerular para clasificar por estadios la severidad de la enfermedad renal de acuerdo a la fórmula de Cockcroft - Gault	Cuantitativa	Continua		Tomado de la última consulta
Antecedente de IAM	Antecedente de infarto agudo del miocardio tomado de la historia clínica.	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
PCI	Revascularización percutánea (Stent)	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente de fibrilación auricular	Taquiarritmia tomado de la historia clínica de cardiología.	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente de cirugía cardíaca	Antecedente de revascularización miocárdica, prótesis biológica, prótesis mecánica	Cualitativa nominal polinómica	Nominal		0. No 1. Revascularización 2. Recambio valvular
Antecedente de estimulación cardíaca	Implante de dispositivo de estimulación cardíaca	Cualitativa nominal polinómica	Nominal		0. No 1. Marcapasos 2. CDI 3. TRC-D
Antecedente de cáncer	Neoplasia maligna documentada	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal	Debe especificar cuál tipo de neoplasia	0. No 1. Sí
Antecedente de radioterapia	Radioterapia recibida como parte del tratamiento del cáncer	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente de quimioterapia	Quimioterapia recibida como parte del tratamiento del cáncer	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente de enfermedad arterial periférica	Obstrucción arterial documentada por Doppler	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí

Antecedente de EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente de ACV/AIT	Antecedente de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Antecedente de Accidente isquémico transitorio	Cualitativo nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente familiar de muerte súbita	Antecedente familiar de muerte súbita en familiar joven	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Antecedente Familiar de insuficiencia cardíaca	Familiares en primer grado con diagnóstico de insuficiencia cardíaca	Cualitativo Nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Peso	Medida de valoración nutricional	Cuantitativa de razón continua	Continua	Kilogramos	
Talla	altura o estatura que se expresa en centímetros	Cuantitativo de razón continua	Continua	Metros	
Índice de masa corporal	peso sobre dos veces la altura	Cuantitativo de razón continua	Continua	peso/altura ²	
Frecuencia cardíaca	Número de latidos cardíacos en un minuto	Cuantitativa discreta	Continua	LPM	
Presión Arterial	Medición de la presión arterial	Cuantitativo de razón continua	Continua	mmHg	
Ingurgitación yugular	Aumento de la presión venosa yugular evaluada mediante el examen físico Tomado de la consulta de ingreso al estudio	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
S3	Presencia de tercer ruido cardíaco Tomado de la consulta de ingreso al estudio	Cualitativo nominal dicotómico	Cualitativo nominal dicotómico		0. No 1. Sí
Estertores	Presencia de sobreagregados pulmonares tipo estertores	Cualitativo nominal dicotómico	Cualitativo nominal dicotómico		0. No 1. Sí

	Tomado de la consulta de ingreso al estudio				
Hepatomegalia	Palpación del hígado por debajo de reborde costal Tomado de la consulta de ingreso al estudio	Cualitativo nominal dicotómico	Cualitativo nominal dicotómico		0. No 1. Sí
Edemas	Edema de miembros inferiores atribuido como signo de insuficiencia cardíaca derecha Tomado de la consulta de ingreso al estudio	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Congestión	Presencia de ingurgitación, S3, estertores, hepatomegalia o edemas (al menos una)	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Clase funcional NYHA	Escala de clase funcional de New York Heart Association	Cualitativa ordinal politómica	Nominal		I-II-III-IV
Hemoglobina	Hemoproteína sanguínea que transporta oxígeno	cuantitativa	Continua	g/dL	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Hematocrito	Porcentaje que ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada, al separarse de su fase líquida	cuantitativa	Continua	Porcentaje	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Anemia	Hemoglobina < o igual 12 g/dL en mujeres. Hemoglobina < o igual 13 g/dL en hombres.	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Sodio	El sodio es el catión mayor del líquido intracelular del organismo humano. Está involucrado en el mantenimiento del equilibrio normal del agua,	cuantitativa	Continua	mEq/L	135-145 mEq/L Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Potasio	El potasio es el catión mayor	cuantitativa	Continua	mEq/L	3.5 – 5.1 mEq/L

	del líquido intracelular del organismo humano. Está involucrado en el mantenimiento del equilibrio normal del agua,				Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
ASAT	Enzima para medir daño hepático: aspartato aminotransferasa	cuantitativa	Continua	UI/L	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
ALAT	Enzima para medir daño hepático: alanina aminotransferasa	cuantitativa	Continua	UI/L	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Albúmina	Proteína	cuantitativa	Continua	gr/dL	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
CK	creatinquinasa Enzima expresada por varios tejidos	cuantitativa	Continua	U/L	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Glicemia	Cantidad de glucosa en la sangre, valor tomado en ayunas	cuantitativa	Continua	gr/dL	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
HBA1C	Valor de la fracción de hemoglobina que tiene glucosa adherida.	cuantitativa	Continua	Porcentaje	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Troponina	Proteína globular presente en el músculo estriado, en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético	cuantitativa	Continua	µg/L	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Ácido úrico	Ácido debil producto final del catabolismo de las purinas	cuantitativa	Continua	mg/dL	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
IgG para Chagas	Anticuerpos IgG contra el Trypanosoma cruzi	Cualitativa Dicotómica	Nominal	0. Negativa 1. Positiva	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Hierro	Niveles séricos de hierro	cuantitativa	Continua	Mcg/dl	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Ferritina	Niveles séricos de ferritina	cuantitativa	Continua	Ng/ml	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Saturación de transferrina	Porcentaje de saturación de transferrina	cuantitativa	Continua	%	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
Déficit de hierro	SOT2 <21% o Ferritina <100	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí

BNP	Péptido natriurético cerebral.	Cuantitativa	Continua	Pg/ml	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
NT-PROBNP	Porción N terminal del propéptido natriurético cerebral	Cuantitativa	Continua	Pg/ml	Tomado del primer laboratorio reportado en la historia.
TSH	Hormona estimulante de tiroides	Cuantitativa	Continua	mUI/L	
Bloqueo de rama izquierda	Presencia de bloqueo de rama izquierda por electrocardiograma aportado por el paciente, o si estaba documentado en la historia clínica.	Cualitativo nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Fracción de eyección ventrículo izquierdo	Porcentaje de sangre expulsado por cada latido cardíaco medido por ecocardiografía	Cuantitativa	Continua	Se clasificó además en una variable politómica: FEVI preservada > 50% (0) FEVI reducida <40%(1) FEVI en rango medio 40-50%.	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo	Diámetro del ventrículo izquierdo medido en diástole en ecocardiografía	Cuantitativa	Continua	Mm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Diámetro sistólico del ventrículo izquierdo	Diámetro del ventrículo izquierdo medido en diástole en ecocardiografía	Cuantitativa	Continua	Mm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Septo	Medición del septo interventricular en ecocardiografía	Cuantitativa	Continua	Mm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Pared posterior	Medición de la pared posterior del ventrículo izquierdo en ecocardiografía	Cuantitativa	Continua	Mm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Masa	Masa indexada de ventrículo izquierdo	Cuantitativa	Continua	g/m2	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Espesor relativo	Espesor relativo del ventrículo izquierdo en ecocardiografía	Cuantitativa	Continua	Mm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
E/e'	Parámetro obtenido con ecocardiografía mediante doppler tisular, que representa la presión final de la	Cuantitativa	Continua		Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.

	diástole del ventrículo izquierdo				
Diástole	Tiempo de llenado del ventrículo izquierdo	Cualitativa nominal politómica	Nominal	0. No disfunción diastólica 1. Grado I 2. Grado II 3. Grado III 4. Grado IV	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
TAPSE	Desplazamiento del anillo tricuspídeo	Cuantitativa	Continua	cm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Disfunción de ventrículo derecho	Si TAPSE menor o igual a 1,7 cm	Cualitativa nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Diámetro del ventrículo derecho	Medido en diástole	Cuantitativa	Continua	Mm	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Área de la aurícula izquierda	Tamaño de la aurícula izquierda	Cuantitativa	Continua	Cm2	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Volumen de la aurícula izquierda	Volumen indexado de aurícula izquierda	Cuantitativa	Continua	ml/m2	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Dilatación de AI	Volumen AI mayor o igual 34 o área AI mayor o igual a 18	Cualitativa nominal dicotómico	Nominal		0. No 1. Sí
Tricúspide	Evaluación ecocardiográfica de la válvula	Cualitativa nominal polinómica	Nominal	0. Normal 1. Insuficiencia 2. Estenosis	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Pulmonar	Evaluación ecocardiográfica de la válvula	Cualitativa nominal polinómica	Nominal	0. Normal 1. Insuficiencia 2. Estenosis	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Aórtica	Evaluación ecocardiográfica de la válvula	Cualitativa nominal polinómica	Nominal	0. Normal 1. Insuficiencia 2. Estenosis	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Mitral	Evaluación ecocardiográfica de la válvula	Cualitativa nominal polinómica	Nominal	0. Normal 1. Insuficiencia 2. Estenosis	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.
Presión sistólica de arteria pulmonar PSAP	Medida indirecta de la presión de la arteria pulmonar que se obtiene adicionando a la presión de la aurícula derecha el gradiente de presión sistólico entre las cámaras derechas	Cuantitativa	Continua	mmHg	Tomado del primer ecocardiograma que aporte el paciente.

Hipertensión pulmonar	Según la PSAP medida por ecocardiografía.	Cualitativa nominal polinómica	Nominal	0. No hipertensión pulmonar PSAP menor o igual a 30 mmHg 1. Hipertensión pulmonar posible PSAP > 30 mmHg 2. Hipertensión pulmonar probable > 49 mmHg	
IECA	Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina	Cualitativa	Nominal	Tomado de la última consulta	0. No 1. Sí
IECA (Porcentaje dosis)	Porcentaje de titulación del fármaco teniendo en cuenta dosis máxima	Cualitativa dicotómica		Tomado de la última consulta	Se clasificó en: 0. Menor o igual al 50% 1. Mayor o igual al 50%
Betabloqueadores	Fármacos bloqueantes de los receptores Beta.	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Betabloqueadores (Porcentaje dosis)	Porcentaje de titulación del fármaco teniendo en cuenta dosis máxima	Cualitativa dicotómica	Continua	Tomado de la última consulta	Se clasificó en: 0. Menor o igual al 50% 1. Mayor o igual al 50%
ARA II	Antagonistas del receptor de la angiotensina II.	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
ARA II (Porcentaje dosis)	Porcentaje de titulación del fármaco teniendo en cuenta dosis máxima	Cualitativa dicotómica	Continua	Tomado de la última consulta	Se clasificó en: 0. Menor o igual al 50% 1. Mayor o igual al 50%
ARM	Antagonistas del receptor de mineralocorticoides	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
ARM (Porcentaje dosis)	Porcentaje de titulación del fármaco teniendo en cuenta dosis máxima	Cualitativa dicotómica	Continua	Tomado de la última consulta	Se clasificó en: 0. Menor o igual al 50% 1. Mayor o igual al 50%
Diuréticos	Medicamento que elimina agua y electrolitos por medio de la diuresis	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Ivabradina	Medicamento de control de frecuencia en pacientes con ritmo sinusal	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Digoxina	Medicamento usado para control de frecuencia	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí

Anticoagulante	Medicamento que interfiere con la vía de la coagulación.	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Antiagregante	Medicamento que inhibe la agregación plaquetaria	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Estatina	Medicamento que estabiliza la placa de ateroma	Cualitativa nominal dicotómica	Nominal		0. No 1. Sí
Escala de Kansas	Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire	Cuantitativa	Continua	Se asigna un puntaje de 0 a 100	Dominios: Limitación física Frecuencia de los síntomas Severidad de los síntomas Estabilidad de los síntomas Calidad de vida Autoeficacia Interferencia social Sumario de síntomas Sumario clínico Sumario general Interpretación: -Pobre calidad de vida puntaje de 0-24 -Calidad de vida regular 25-49 -Buena calidad de vida 50 – 74 -Excelente calidad de vida 75-100

Variable desenlace:

- **Deterioro de calidad de vida:** Pacientes con puntaje 0 a 49,9 en los dominios de resumen de la escala de Kansas (Puntaje de síntomas totales, resumen clínico, resumen general).

4.12 Análisis estadístico

Inicialmente se llevó a cabo el análisis descriptivo univariado. Para las variables cualitativas se realizó el cálculo de las frecuencias absolutas y porcentuales, mientras que para las variables cuantitativas se calcularon las medidas de resumen según la normalidad. En este sentido, para las variables paramétricas se reportó la media y la

desviación estandar, y en cuanto a las variables no paramétricas se reportó la mediana y el rango intercuartil.

Se estratificó la edad en ≤ 65 años y >65 años para realizar el análisis bivariado. Para el análisis de una variable cualitativa con la edad estratificada se calcularon las frecuencias absolutas y porcentuales, mientras que para el análisis con una variable cuantitativa se calcularon las medidas de tendencia central y se reportaron según su normalidad. Para los procedimientos de estadística inferencial se realizó la prueba de Shapiro Wilk para probar normalidad y en el caso de las variables con distribución normal se realizó la prueba F para evaluar homocedasticidad.

Para las variables cuantitativas, se analizó según su distribución, las diferencias de medias o de medianas con respecto a la edad estratificada, por medio de la prueba t para muestras independientes o U de Mann Whit-ney según su distribución.

Para las variables cualitativas, se estableció la asociación de las variables independientes con respecto a la edad estratificada, por medio de la prueba de Chi cuadrado de independencia o de Fisher según el número de categorías (dicotómica o politómicas) y la frecuencia esperada.

Adicionalmente, se categorizó la variable calidad de vida según el puntaje en Deterioro vs no deterioro de calidad de vida, y se realizaron los procedimientos de estadística inferencial ya descritos para el análisis bivariado de esta. Se aceptó una significación estadística de un valor $p < 0.05$ y se utilizó el software STATA 13 como herramienta para el análisis de los datos.

5. ASPECTOS ÉTICOS

La investigación se realizó de acuerdo a la Resolución No. 08430 de 1993 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité Técnico Científico del Instituto del Corazón de Bucaramanga, el Comité Operativo de Investigación y Extensión de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el Comité de Ética en Investigación de la FOSCAL, número de dictámen 00603/2019.

Para garantizar los principios éticos en esta investigación se tuvo en cuenta lo siguiente:

El principio de respeto y autonomía: ofreciendo la libertad de participar o no en el estudio mediante el consentimiento informado, y de retirarse en el momento que desearan.

Se garantizaron los principios de beneficencia y no maleficencia. Esta investigación se considera de riesgo de mínimo acuerdo al artículo 11, categoría “b” de la Resolución No. 08430 de 1993 del Ministerio de Salud, porque se trata de un estudio observacional que emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes como una encuesta, examen físico y resultados de estudios diagnósticos realizados.

El principio de justicia se tuvo en cuenta dado que ninguno de los participantes fue objeto de discriminación por cualquier circunstancia. Los participantes no recibieron ningún pago por las valoraciones o visitas que realice el equipo investigador.

Se garantizó la confidencialidad y privacidad de la información, evitando utilizar el nombre de la persona tanto en las encuestas como en las bases de datos. Se asignó un código de identificación para cada paciente. Los registros fueron custodiados por los investigadores. Los resultados no estarán disponibles para terceras personas a menos que el participante autorice o la Ley lo permita. En todo caso se cumplirá con lo reglamentado en la Ley estatutaria 1581 de 2012 sobre el tratamiento de datos personales.

6. RESULTADOS

6.1 Análisis univariado de características generales

En el periodo de tiempo comprendido entre agosto del 2019 a marzo del 2020, ingresaron al estudio 166 participantes que asistieron a la consulta externa de la Unidad Funcional de Insuficiencia Cardíaca, en el Instituto del Corazón de Bucaramanga (Tabla 6). La mediana de edad de los participantes fue 66 años (RIQ: 58 - 73). El 58% de los pacientes eran de sexo masculino. La mayoría de los pacientes (n=139) provenían de área urbana. Los pacientes tenían una mediana de seguimiento de 5,3 años (RIQ: 1 – 7,2), desde el primer día de consulta a la unidad de insuficiencia cardíaca, hasta el día de ingreso al estudio.

Con respecto al tipo de cardiopatía las 3 más frecuentes fueron: isquémica (36,1%), idiopática (28,3%) y chagásica (19,9%) (Gráfica 1). La mediana de consultas a la unidad funcional de insuficiencia cardíaca en el último año fue de 4 (RIQ: 3-4). El 15,6% de los pacientes habían requerido hospitalización en el último año a causa de insuficiencia cardíaca.

Con respecto a las comorbilidades las más frecuentes fueron: Enfermedad renal crónica (definida como tasa de filtración glomerular ≤ 60 mL/min/1.73 m²), con una prevalencia del 50%, hipertensión arterial 42,8%, antecedente de infarto agudo del miocardio 37%, fibrilación auricular 29,5% y diabetes mellitus tipo 2 16,9% (Gráfica 2). La clase funcional estimada por la escala NYHA se encontraba entre I – II en la mayoría de los pacientes al momento del ingreso al estudio (30% y 59%, respectivamente).

Al evaluar clínicamente a los pacientes, 39 participantes tenían signos clínicos de congestión al momento de la consulta (Ingurgitación yugular, S3, estertores, hepatomegalia, edemas). Un porcentaje importante (51%) eran portadores de algún dispositivo de estimulación cardíaca, la mayor parte cardiodesfibrilador implantable (n=63). Con respecto a los laboratorios aportados, se pueden observar en la Tabla 6.

Al evaluar las principales variables ecocardiográficas, la mediana de fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) fue de 35 (RIQ: 24 – 43), la mediana de diámetro diastólico de ventrículo izquierdo (DDVI) fue de 5,9 cm (RIQ: 5,2 – 6,5). El 29,6% tenían disfunción del ventrículo derecho, el 33% tenían disfunción diastólica, el 73,2% cumplían criterios para hipertensión pulmonar posible o probable y el 70,9% de los pacientes tenían FEVI reducida.

En relación a los medicamentos de bloqueo neurohormonal, el 99,4% de los pacientes tenían betabloqueadores, el 96% de los pacientes tenían algún inhibidor del eje renina angiotensina aldosterona (IECA 18,2% , ARA2 22,9% o Sacubitril/Valsartán 55,4%), y el 80,7% tenían antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Aproximadamente la mitad de los pacientes tenían formulado un diurético (51,2%).

Tabla 6. Análisis univariado: Características clínicas y demográficas

Variable	Valores n = 166
Edad, años	66 (58-73)
Sexo n (%)	
Hombres	97 (58)
Procedencia n (%)	
Urbana	130 (78)
Rural	36 (22)
Tipo de cardiopatía n (%)	
Isquémica	60 (36,1)
Chagásica	33 (19,9)
Valvular	9 (5,4)
Idiopática	47 (28,3)
Hipertensiva	6 (3,6)
Otras	11 (6,6)

Continuación tabla 6

NYHA n (%)	
I	51 (30)
II	98 (59)
III	17 (1)
IV	0 (0)
Hallazgos clínicos	
PAS, mmHg	115(104-127,8)
FC, latidos por minuto	69 (64,25-77)
Signos clínicos de congestión n (%)	39 (23,5)
Bloqueo de rama izquierda n (%)	
	30 (25,9)
Dispositivo de estimulación n (%)	
CDI	63 (37,9)
TRC-D	13 (7,8)
Marcapasos	9 (5,4)
Laboratorios (RIQ)	
Hemoglobina, g/dL	13,7 (12,3-14,5)
Sodio, mEq/L	139.7(138-149)
Potasio, mEq/L	4,4 (4,2-4,8)
TFG, mL/min/1,73 m ²	44 (26,5-64,5)
AST, U/L	23 (17-27,25)
ALT, U/L	22 (17,8-28,5)
BNP, pg/ml	197,5(155 -536)
NT-PROBNP, pg/ml	928 (336 -1932)
Ácido úrico, mg/dL	6,1 (5-14)
HBA1C, %	6,17 (5,7-6,9)
TSH, mU/L	2,92 (1,95-4,46)
Anemia n (%)	38 (22,9)
Deficiencia de hierro n (%)	48 (28,9)

Continuación tabla 6

Ecocardiográficas (RIQ)	
FEVI, %	35 (24-43)
DDVI, cm	5,9(5,2-6,5)
DSVI, cm	4,7(3,6-5,5)
Septo, cm	1(0,8-1,1)
Pared posterior, cm	0,9 (0,77-1)
TAPSE, cm (RIQ)	1,934±0,44
PSAP, mmHg	38(30-50)
DVD, cm	2,9(2,6-3,8)
Disfunción VD n (%)	16 (29,6)
Dilatación AI n (%)	126 (88,1)
Insuficiencia mitral n (%)	115 (72,8)
Disfunción diastólica (%)	53 (33)
Diástole, Grado I n (%)	17 (10,6)
Diástole, Grado II n (%)	25 (15,6)
Diástole, Grado III n (%)	11 (6,9)
Hipertensión pulmonar n (%)	96(73,2)
Hipertensión pulmonar posible n (%)	60 (46,2)
Hipertensión pulmonar probable n (%)	36 (27,7)
FEVI reducida n (%)	117(70,9)
FEVI intermedia n (%)	26(15,7)
FEVI preservada n (%)	22 (13,3)
Medicamentos n (%)	
Betabloqueadores	165 (99,4)
IECA	30 (18,2)
ARAI	38 (22,9)
Sacubitril/Valsartán	92 (55,4)
ARM	134 (80,7)
Ivabradina	13 (7,8)
Digoxina	30 (18)
Diurético	86 (51,2)
Anticoagulante	66 (39,8)
Antiagregante	60 (36,1)
Estatina	106 (63,9)
Amiodarona	26 (15,7)

RIQ: Rango intercuartílico; IC: Insuficiencia cardíaca; HTA: hipertensión arterial; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; TFG: Tasa de filtración glomerular; ERC: Enfermedad renal crónica; IAM: Infarto agudo del miocardio; ICP: Intervención coronaria percutánea; ACV: Accidente cerebro vascular; AIT: Accidente isquémico transitorio; NYHA: New York Heart Association; FEVI: Fracción de eyección ventrículo izquierdo; DDVI: Diámetro diastólico ventrículo izquierdo; DSVI: Diámetro sistólico ventrículo izquierdo; PSAP: Presión sistólica de arteria pulmonar; DVD: Diámetro de ventrículo derecho; VD: Ventrículo derecho; AI: Aurícula izquierda; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA2: Antagonistas del receptor de la angiotensina II; ARM: Antagonista de receptor de mineralocorticoides.

Gráfica 1. Tipos de cardiopatía en la población general n=166

Gráfica 2. Comorbilidades más frecuentes en la población general n=166

ERC: Enfermedad renal crónica; HTA: Hipertensión arterial; IAM: Infarto agudo del miocardio; FA; Fibrilación auricular.

6.2 Análisis univariado calidad de vida

Al analizar los componentes de calidad de vida evaluada mediante la escala de *Kansas* (Tabla 7), los 3 dominios con mayor afectación fueron: severidad de los síntomas 73,3 (RIQ: 60 – 86,7), estabilidad de los síntomas 60 (RIQ: 40 – 80) y calidad de vida 58,3 (RIQ: 75 – 100). En los puntajes de resumen: La mediana del total de síntomas fue de 80 (RIQ: 57,5 – 93,3), el resumen clínico 77,7 (RIQ: 59,1 – 91,6) y resumen total 72,7 (RIQ: 55,7 – 84,7).

Al estratificar los puntajes de calidad de vida en pobre, buena, regular y excelente (según lo estipulado en la escala de *Kansas*), la mayoría de pacientes tenían excelente calidad de vida en todos los dominios evaluados.

Tabla 7. Análisis univariado calidad de vida

Dominio	Mediana (RIQ) n=166
<i>Componentes Kansas</i>	
Limitación física (RIQ)	79,1 (58,7-95)
Frecuencia de síntomas	85 (60-100)
Severidad de los síntomas	73,3(60-86,7)
Estabilidad de los síntomas	60(40-80)
Calidad de vida	58,3(75-100)
Autoeficiencia	87,5(75-100)
Interferencia social	79,05(50-100)
<i>Síntomas total</i>	80(57,5-93,3)
<i>Resumen clínico</i>	77,7(59,1-91,6)
<i>Resumen total</i>	72,7(55,7-84,65)

Continuación tabla 7

Limitación física n (%)	
Mala	2 (1,2)
Regular	23 (13,9)
Buena	47 (28,3)
Excelente	94 (56,6)
Frecuencia de síntomas n (%)	
Mala	4 (2,4)
Regular	21 (12,7)
Buena	34 (20,5)
Excelente	107 (64,5)
Severidad de los síntomas n (%)	
Mala	4 (2,4)
Regular	24 (14,5)
Buena	64 (38,6)
Excelente	74 (44,6)
Estabilidad de los síntomas n (%)	
Mala	12 (7,2)
Regular	56 (33,7)
Buena	37 (22,3)
Excelente	74 (44,6)
Calidad de vida n (%)	
Mala	19 (11,4)
Regular	33 (19,9)
Buena	69 (41,6)
Excelente	45 (27,1)
Autoeficiencia n (%)	
Mala	2 (1,2)
Regular	4 (2,4)
Buena	28 (16,9)
Excelente	132 (79,5)
Interferencia social n(%)	
Mala	6 (3,6)
Regular	28 (16,9)
Buena	32 (19,3)
Excelente	100 (60,2)
Síntomas total n (%)	
Mala	4 (2,4)
Regular	24 (14,5)
Buena	42 (25,3)
Excelente	96 (57,8)
Resumen clínico n (%)	
Mala	1 (0,6)
Regular	22 (13,3)
Buena	53 (31,9)
Excelente	90 (54,2)
Resumen total n (%)	
Mala	2 (1,2)
Regular	30 (18,1)
Buena	55 (33,1)
Excelente	79 (47,6)

RIQ: Rango intercuartílico.

6.3 Análisis bivariado de características generales ≤ 65 años vs mayores de 65 años

De la totalidad de pacientes, 82 eran ≤ 65 años y 84 mayores de 65 años (Tabla 8). La mediana de edad para los pacientes ≤ 65 años era de 56 años (RIQ: 50-61) vs 73 años (RIQ: 69-79). Hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto al género al comparar los dos grupos de edad (57,7% eran hombres en el grupo de ≤ 65 años vs 42,3 % en el grupo de >65 años, $p=0,001$).

Con respecto al tipo de cardiopatía hubo un comportamiento similar en los dos grupos de edad (Gráfica 3), siendo las más frecuentes la isquémica, idiopática y chagásica. Se observó un mayor número de pacientes ≤ 65 años con otro de tipo de cardiopatías (hemocromatosis, taquicardiomiopatías, miocarditis viral, congénitas) vs los > 65 años (9,8% vs 3,6%).

Se observaron diferencias en cuanto al número de hospitalizaciones en el último año en los dos grupos de edad (25,6% en ≤ 65 años vs 6,1% en > 65 años, $p = 0,001$). Las comorbilidades que fueron estadísticamente diferentes en los dos grupos evaluados son: hipertensión, con mayor predominancia en el grupo de mayores (32,9% en ≤ 65 años vs 52,4% en > 65 años, $p= 0,01$) y enfermedad renal crónica (24,4% en ≤ 65 años vs 75% en >65 años, $p=0,01$). En el grupo de menores fue más frecuente la presencia de cardiopatía familiar (19,5% en ≤ 65 años vs 6% % en >65 años, $p=0,009$) y muerte súbita en familiar de primer grado (6,1% en ≤ 65 años vs 1,2% en >65 años, $p=0,09$).

En la evaluación clínica la clase funcional NYHA fue similar en los dos grupos de edad. Se encontraron diferencias en cuanto a la presencia de bloqueo de rama izquierda (17,9% en ≤ 65 años vs 33,3% en >65 años, $p=0,06$). En el análisis de laboratorios, las variables estadísticamente diferentes fueron TFG ($p=0,001$), y anemia (16,3% en ≤ 65 años vs 29,7% en >65 años, $p=0,029$).

Tabla 8. Análisis bivariado características demográficas y clínicas ≤ 65 años vs >65 años

Variable	≤ 65 años n= 82	> 65 años n= 84	
Edad, años (RIQ)	58 (50-61)	73 (69-79)	<0,000
Sexo n (%)			
Hombres	56 (57,7)	41 (42,3)	0,01
Procedencia n (%)			
Urbana	68 (82,9)	62 (73,8)	0,15
Rural	14 (17,1)	22 (26,2)	
Tipo de cardiopatía n (%)			
Isquémica	31 (37,8)	29 (34,5)	0,4
Chagásica	16 (19,5)	17 (20,2)	
Valvular	4 (4,9)	5 (6)	
Idiopática	22 (26,8)	25 (29,8)	
Hipertensiva	1 (1,2)	5 (6)	
Otras	8 (9,8)	3 (3,6)	
Comorbilidades n (%)			
Número de consultas	4 (3 - 4)	4 (3-5)	0,053
Hospitalizaciones por IC	21 (25,6)	5 (6,1)	0,001
HTA	27 (32,9)	44 (52,4)	0,01
DM2	10 (12,2)	18 (21,4)	0,11
ERC (TFG ≤ 60 mL/min/1,73 m2)	20 (24,4)	63 (75)	<0,001
IAM	32 (39)	31 (36,9)	0,78
ICP	27 (32,9)	30 (46,9)	0,66
Revascularización miocárdica	8 (9,7)	7 (8,3)	0,75
Fibrilación auricular	20 (24,3)	29 (34,5)	0,15
Taquicardia ventricular	8 (9,7)	3 (3,5)	0,11
Cáncer	3 (3,7)	7 (8,3)	0,21
ACV/AIT	6 (7,3)	2 (2,3)	0,13
Cardiopatía familiar	16 (19,5)	5 (6,0)	0,009
Muerte súbita en familiar en 1er g 5	5 (6,1)	1 (1,2)	0,09
NYHA n (%)			
I	29 (35,4)	22 (26,2)	0,4
II	46 (56,1)	52 (61,9)	
III	7 (8,5)	10 (11,9)	
IV	0 (0)	0 (0)	

Continuación tabla 8

PAS, mmHg (RIQ)	115 (103 - 124)	116 (104 - 130)	0,88
FC, latidos por minuto (RIQ)	69 (65 - 76)	69 (62 - 77)	0,88
Signos clínicos de congestión n (%)	17 (20,7)	22 (26,2)	0,41
Bloqueo de rama izquierda n (%)	10 (17,9)	20 (33,3)	0,06
Dispositivo de estimulación n (%)			
CDI	38 (46,3)	25 (29,8)	0,35
TRC-D	5 (6,1)	8 (9,5)	
Marcapasos	2 (2,4)	7 (8,3)	
Laboratorios mediana (RIQ)			
Hemoglobina, g/dL	13,8±1,52	13,07±1,68	0,003
Sodio, mEq/L	141,2±4,5	139,4±4,6	0,39
Potasio, mEq/L	4,39 (4,2 - 4,8)	4,4 (4,2 - 4,8)	0,36
TFG, mL/min/1,73 m ²	58 (44 - 75)	31,5 (17 - 44)	<0,001
AST, U/L	23 (17 - 28)	21 (17,5 - 27)	0,97
ALT, U/L	24,4(18-34,2)	22(18-24,7)	0,47
BNP, pg/ml	191,5(170,5-312,5)	271(80,4-580,5)	0,42
NT-PROBNP, pg/ml	505,5 (261 - 1892)	1157,5 (793 - 2086)	0,16
Ácido úrico, mg/dL	6,34±2,08	6,69±2,61	0,29
HBA1C, %	5,9 (5,5 - 7,1)	6,2 (5,7 - 6,7)	0,11
TSH, mU/L	32(22-41)	35(25-45,2)	0,5
Anemia n (%)	13 (16,3)	25 (29,7)	0,029
Deficiencia de hierro n (%)	23 (28,0)	25 (29,8)	0,05

*Los valores con ± corresponden a medias con desviación estándar.

RIQ: Rango intercuartílico; IC: Insuficiencia cardiaca; HTA: hipertensión arterial; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; TFG: Tasa de filtración glomerular; ERC: Enfermedad renal crónica; IAM: Infarto agudo del miocardio; ICP: Intervención coronaria percutánea; ACV: Accidente cerebro vascular; AIT: Accidente isquémico transitorio; NYHA: New York Heart Association

Con respecto a las variables ecocardiográficas (Tabla 9), los diámetros del ventrículo izquierdo fueron mayores en el grupo de ≤ 65 años, mediana de DDVI 6,1 cm (5,5-6,7) vs 5,6 cm (4,8-6,3) en los > 65 años ($p=0,04$), mediana de DSVI 4,9 cm (4,1-6) vs 4,5 cm (3,5-5,02) en los > 65 años ($p=0,04$). El grupo de menores tuvo FEVI más bajas (reducida e intermedia) comparadas con los >65 años ($p=0,003$) (Gráfica 4). La prescripción de medicamentos fue similar en los 2 grupos, a excepción de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides que fue menor el grupo de mayores (92,7% en ≤ 65 años vs 69% en >65 años, $p= 0,001$). En la gráfica 5 se presenta el comportamiento de la disfunción diastólica según la edad.

El bloqueo neurohormonal (Tabla 9), se categorizó de acuerdo al porcentaje de la dosis recibida en la última consulta, se observó que la mayoría de pacientes tenían titulada la

dosis en más del $\geq 50\%$, excepto en el grupo de inhibidores de la ECA. No se encontraron diferencias significativas en los dos grupos.

Tabla 9. Análisis bivariado características ecocardiográficas y medicamentos en ≤ 65 años vs >65 años

Variable	≤ 65 años n= 82	> 65 años n= 84	p
FEVI, %	31,2 $\pm$ 12,48	36,7 $\pm$ 13,6	0,17
DDVI, cm (RIQ)	6,1 (5,5-6,7)	5,6(4,8-6,3)	0,04
DSVI, cm (RIQ)	4,9(4,1-6)	4,5(3,5-5,02)	0,04
Septo, cm (RIQ)	0,9 (0,8 - 1,1)	1 (0,9 - 1,1)	0,29
Pared posterior, cm (RIQ)	0,92 $\pm$ 0,23	0,90 $\pm$ 0,25	0,58
TAPSE, cm (RIQ)	3,15 $\pm$ 0,81	3,18 $\pm$ 0,80	0,32
PSAP, mmHg (RIQ)	40 (30 - 50)	38 (30 - 47)	0,66
DVD, cm (RIQ)	2,9 (2,6 - 3,5)	2,9 (2,6 - 3,8)	0,13
Disfunción VD n (%)	9 (10,9)	7 (8,3)	0,23
Dilatación AI n (%)	64 (78)	62 (73,8)	0,62
Insuficiencia mitral n (%)	55 (67)	60 (71,4)	0,47
Diastole n (%)	29(36,2)	24(30)	0,5
Diástole, Grado I n (%)	9 (10,9)	8 (9,5)	0,04
Diástole, Grado II n (%)	14 (17,1)	11 (13,1)	
Diástole, Grado III n (%)	6 (7,3)	5 (6)	
Hipertensión pulmonar n (%)	49(64,2)	47(72)	0,95
Hipertensión pulmonar posible n (%)	27 (32,9)	33 (39,3)	0,13
Hipertensión pulmonar probable n (%)	22 (26,8)	14 (16,6)	
FEVI reducida n (%)	60(74,1)	57(67,9)	0,003
FEVI intermedia n (%)	17(21)	9(10,7)	
FEVI preservada n (%)	4(4,9)	18(21,4)	
Medicamentos n (%)			
Betabloqueadores	81 (98,8)	100 (100)	0,49
IECA	15 (18,3)	15 (18,1)	0,97
ARAI	16 (19,5)	22 (26,2)	0,31
Sacubitril/Valsartán	49 (59,8)	43 (51,2)	0,27
ARM	76 (92,7)	58 (69)	<0,001
Ivabradina	9 (10,9)	4 (4,8)	0,14
Digoxina	11 (13,4)	19 (22,6)	0,123
Diurético	41 (50)	45 (53,8)	0,64
Anticoagulante	31 (37,8)	35 (41,7)	0,61
Antiagregante	29 (35,4)	26 (31)	0,84
Estatina	48 (58,5)	58 (69)	0,16
Amiodarona	16 (19,5)	10 (11,9)	0,18

Continuación tabla 9

Variable	≤ 65 años n= 82	> 65 años n= 84	p
Porcentaje de dosis de Bloqueo neurohormonal			
Porcentaje dosis Betabloqueador n (%)	n = 81	n = 84	
<50% de la dosis	16 (19,8)	19 (22,6)	0,65
≥ 50% de la dosis	65 (80,2)	65 (77,4)	
Porcentaje dosis IECA n (%)	n = 16	n = 15	
<50% de la dosis	8 (50)	9 (60)	0,58
≥ 50% de la dosis	8 (50)	6 (40)	
Porcentaje dosis ARAII n (%)	n = 16	n = 22	
<50% de la dosis	6 (37,5)	8 (36,4)	0,94
≥ 50% de la dosis	10 (62,5)	14 (63,3)	
Porcentaje dosis Sacubitril/Valsartán n (%)	n = 49	n = 43	
<50% de la dosis	2 (4,1)	2 (4,7)	0,89
≥ 50% de la dosis	47 (95,9)	41 (95,3)	
Porcentaje dosis ARM n (%)	n = 76	n = 58	
<50% de la dosis	3 (3,9)	3 (5,2)	0,73
≥ 50% de la dosis	73 (96,1)	55 (94,8)	

*Los valores con ± corresponden a medias con desviación estándar. RIQ: Rango intercuartílico; FEVI: Fracción de eyección ventrículo izquierdo; DDVI: Diámetro diastólico ventrículo izquierdo; DSVI: Diámetro sistólico ventrículo izquierdo; PSAP: Presión sistólica de arteria pulmonar; DVD: Diámetro de ventrículo derecho; VD: Ventrículo derecho; AI: Aurícula izquierda; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA2: Antagonistas del receptor de la angiotensina II; ARM: Antagonista de receptor de mineralocorticoides.

Gráfica 3. Frecuencia absoluta de tipos de cardiopatía según la edad ≤ 65 años vs mayores de 65 años

Gráfica 4. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo según la edad

Gráfica 5. Disfunción diastólica según la edad

6.4 Análisis bivariado calidad de vida ≤ 65 años vs mayores de 65 años

Los dominios de calidad de vida se comportaron de manera similar en los dos grupos evaluados (Gráfico 9), no hubo diferencias estadísticamente significativas determinadas por la edad (Tabla 10).

Posteriormente, se estratificaron según el puntaje en pobre, regular, buena y excelente, y tampoco se encontraron diferencias al comparar los dos grupos. En los gráficos 6, 7 y 8, se observa la frecuencia absoluta de los puntajes de resumen (síntomas totales, resumen clínico, resumen general; respectivamente) según la edad.

En la tabla 10 se observa que los dominios con mayor afectación en ambos grupos fueron calidad de vida y estabilidad de los síntomas.

Tabla 10. Análisis bivariado calidad de vida ≤ 65 años vs mayores de 65 años

Dominio	≤65 años n=82	>65 años n=84
Limitación física (RIQ)	79,1(58,3-72,85)	75(60-95,2)
Frecuencia de síntomas (RIQ)	82,5(55-75)	85(60-76)
Severidad de los síntomas (RIQ)	73,3(60-86,7)	
Estabilidad de los síntomas (RIQ)	60(40-80)	
Calidad de vida (RIQ)	58,3(4)	
Autoeficiencia (RIQ)		
Interferencia social (RIQ)		
Síntomas total (RIQ)		
Resumen clín		
Resu		

Continuación tabla 10

Estratificado n =166			
Limitación física n (%)			
Mala	2 (2,4)	0 (0)	0,38
Regular	12 (14,6)	11 (13,1)	
Buena	20 (24,4)	27 (32,1)	
Excelente	48 (58,5)	46 (54,8)	
Frecuencia de síntomas n (%)			
Mala	1 (1,2)	3 (3,6)	0,49
Regular	13 (15,9)	8 (9,5)	
Buena	17 (20,7)	17 (20,2)	
Excelente	51 (62,2)	56 (66,7)	
Severidad de los síntomas n (%)			
Mala	1 (1,2)	3 (3,6)	0,6
Regular	14 (17,1)	10 (11,9)	
Buena	30 (36,6)	34 (40,5)	
Excelente	37 (45,1)	34 (44)	
Estabilidad de los síntomas n (%)			
Mala	8 (9,8)	4 (4,8)	0,35
Regular	24 (29,3)	32 (38,1)	
Buena	21 (25,6)	16 (19)	
Excelente	29 (35,4)	32 (38,1)	
Calidad de vida n (%)			
Mala	11 (13,4)	8 (9,5)	0,83
Regular	16 (19,5)	17 (20,2)	
Buena	32 (39)	37 (44)	
Excelente	23 (28)	22 (26,2)	
Autoeficiencia n (%)			
Mala	1 (1,2)	1 (1,2)	0,47
Regular	1 (1,2)	3 (3,6)	
Buena	11 (13,4)	17 (20,2)	
Excelente	69 (84,1)	63 (75)	
Interferencia social n(%)			
Mala	4 (4,9)	2 (2,4)	0,29
Regular	13 (15,9)	15 (17,9)	
Buena	20 (24,4)	12 (14,3)	
Excelente	23 (28)	55 (65,5)	
Síntomas total n (%)			
Mala	1 (1,2)	3 (3,6)	0,61
Regular	14 (17,1)	10 (11,9)	
Buena	20 (24,4)	22 (26,2)	
Excelente	47 (57,3)	49 (58,3)	
Resumen clínico n (%)			
Mala	1 (1,2)	0 (0)	0,45
Regular	13 (15,9)	9 (10,7)	
Buena	23 (28)	30 (35,7)	
Excelente	45 (54,9)	45 (53,6)	
Resumen total n (%)			
Mala	2 (2,4)	0 (0)	0,54
Regular	15 (18,3)	15 (17,9)	
Buena	26 (31,7)	29 (34,5)	
Excelente	39 (47,6)	40 (47,6)

Gráfica 6. Frecuencia de absoluta de síntomas totales.

Gráfica 7. Frecuencia de absoluta del resumen clínico

Gráfica 8. Frecuencia de absoluta del resumen general

Gráfica 9. Gráfico de cajas y bigotes resumen general según la edad

6.5 Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida

La prevalencia de pobre/regular calidad de vida en la población total fue de 19,3%.

La presencia de 1 o más hospitalizaciones en el último año a causa de IC y la clase funcional NYHA III-IV, estuvieron asociadas a peor calidad de vida en el resumen general de la escala de *Kansas city* ($p= 0,01$ y $p= <0,001$, respectivamente). El resto de variables no presentaron asociación. Adicionalmente, se encontró que la variable ACV estuvo asociada con una peor calidad de vida en el el puntaje de síntomas totales ($p=0,028$).

Tabla 11. Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida

Variable	No deterioro calidad de vida n(%)	Deterioro calidad de vida n(%)	Valor p
Edad ≤ 65 años n=82	65 (79,27)	17 (20,73)	0,63
Edad > 65 años n=84	69 (82,1)	15 (17,9)	
Hipertensión arterial n=71	62 (80,2)	9 (12,68)	0,06
DM2 n=28	24 (85,7)	4 (14,2)	0,33
ERC n=83	68 (81,9)	15 (18,1)	0,69
ACV n=8	5 (62,5)	3 (37,5)	0,18
NYHA III-IV n=17	5 (29,5)	12 (70,5)	$<0,001$
Hospitalizaciones en el último año n= 26	17 (65,4)	9 (34,6)	0,01
Anemia n= 38	30 (78,9)	8 (21,1)	0,67
Déficit de hierro n=48	39 (81,3)	9 (18,7)	0,72
Fibrilación auricular n=49	38 (77,5)	11 (22,5)	0,5
FEVI $<50\%$ n=139	113 (81,3)	26 (18,7)	0,61
Disfunción VD n=16	11 (68,7)	5 (31,3)	0,11
Dilatación aurícula izquierda n=126	103 (81,7)	23 (18,3)	0,5
Hipertensión pulmonar n= 96	77 (80,2)	19 (19,8)	0,7
ARAI $\leq 50\%$ n=24	21 (87,5)	3 (12,5)	0,62
IECA $\leq 50\%$ n=14	14 (100)	0 (0)	0,29
Sacubitril/Valsartán $\leq 50\%$ n=88	65 (73,9)	23 (26,1)	0,96

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; ERC: Enfermedad renal crónica; ACV: Accidente cerebrovascular; FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; VD: Ventrículo derecho; ARA II: Antagonistas de receptores de la angiotensina II; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

7. DISCUSIÓN

Esta investigación, aporta valiosa información sobre las características epidemiológicas, clínicas y de CVRS en pacientes con insuficiencia cardiaca en una población Colombiana.

En el presente estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la edad y los diferentes dominios de calidad de vida en la escala de *Kansas city*. La edad estratificada como ≤ 65 años vs mayores de 65 años, no estuvo asociada con deterioro de la calidad de vida en los puntajes de resumen.

La prevalencia de pobre/regular calidad de vida encontrada en la totalidad de la muestra (19,3%), fue ligeramente menor a la reportada por el estudio de Chan, et al, cuya prevalencia fue del 21,2% (40). No hay otros estudios que reporten prevalencia de calidad de vida estratificada por puntajes, por lo que no se pueden hacer otras comparaciones.

Los puntajes de calidad de vida global en el estudio de Masoudi et,al (5), el cual evaluó las diferencias en CVRS medida por la escala de Kansas según la edad (Media: 54 DE 28 en ≤ 65 años vs 60 DE 25 en > 65 años) , fueron menores comparados con las del presente estudio. Adicionalmente dicho estudio sí encontró diferencias significativas entre los dos grupos etáreos ($p= 0,005$).

Los dominios más afectados en todos los grupos de edad fueron: el dominio de calidad de vida y el dominio de estabilidad de síntomas, aunque no hubo diferencias entre los 2 grupos etáreos. En contraste, con lo encontrado en el estudio de Butler et al (41), que evaluó la calidad de vida en 459 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, se observó que los dominios con mayor afectación en la la CVRS medida por la escala de *Kansas* fueron: Calidad de vida (Media: 48 DE: 22), interferencia social (Media: 51 DE: 25) y limitación física (Media de 52 DE 22).

Se encontraron 3 predictores clínicos asociados a peor CVRS: Hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, clase funcional NYHA III-IV y antecedente de accidente cerebrovascular. Hallazgos consistentes con otros estudios, donde las variables asociadas con pobre calidad de vida fueron la escala de NYHA y las hospitalizaciones (33). Si bien los pacientes jóvenes se hospitalizaron más a causa de IC, esto no influyó en los puntajes de calidad de vida evaluados por la escala de *Kansas* en este grupo etéreo.

Con respecto a la etiología de la insuficiencia cardíaca, se observaron proporciones similares de los tipos de cardiopatía entre los dos grupos etéreos, sin diferencias estadísticamente significativas. Otros estudios, han encontrado que en los jóvenes predomina la etiología idiopática, sobre la isquémica (5,24). Así mismo, en el presente estudio se observó que en los jóvenes hubo una mayor prevalencia de otro tipo de cardiopatías como taquicardiomiopatías, miocardiopatía viral, cardiotóxicas y hemocromatosis, hallazgo concordante con dichos estudios.

En contraste con la literatura (33), la comorbilidad más frecuente encontrada en esta investigación fue enfermedad renal crónica. Estas diferencias podrían ser explicadas por las discrepancias en la definición de la variable. La hipertensión arterial presentó una prevalencia similar (44%) vs lo reportado en el estudio de Hoesktra (33).

La hipertensión pulmonar se presentó en el 73% de la población general, sin embargo no hubo asociación con pobre calidad de vida, lo cual es similar a lo registrado en el estudio ESCAPE (42), donde no se encontró asociación entre hipertensión pulmonar mixta en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y resultados clínicos adversos a corto plazo. Sin embargo, esto debe ser interpretado con precaución dado que la clasificación de hipertensión pulmonar que se hizo en este estudio fue realizada mediante datos ecocardiográficos.

Un porcentaje importante de la población estudiada (86,5%) presentó una FEVI <50% (borderline y reducida). Este hallazgo difiere con la literatura. Por ejemplo en el estudio de Bursi et, al (43), se describió una prevalencia de FEVI deprimida (<50%) del 44,7%.

Al estratificar en las 4 categorías de puntaje de calidad de vida (mala, regular, buena, excelente) , se observó que la mayor parte de la población evaluada tiene una excelente calidad de vida. Esto puede estar relacionado con la oportunidad de consultas de seguimiento con una mediana de 4 consultas por año, lo cual permite modificaciones y titulaciones progresivas de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Además corrobora la importancia de un abordaje diagnóstico y terapéutico guiado por un cardiólogo clínico en una unidad funcional de insuficiencia cardiaca.

Es importante destacar que el 96% de los pacientes tenían algún inhibidor del eje renina angiotensina aldosterona, el 99,4% tenían un betabloqueador y el 80,7% tenían antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Además, la mayor parte de los pacientes tenían dosis de bloqueo neurohormonal >50%. Factor que puede estar relacionado con los mejores puntajes en calidad de vida obtenidos en la población.

Este estudio tiene varias implicaciones, primero la implementación de una escala multidimensional específica para insuficiencia cardiaca, permitió identificar cuáles son los dominios con mayor afectación en este grupo poblacional. Lo cual podrá llevar a la ejecución de estrategias de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, basadas en mejorar dichos aspectos, incluso cuando la prolongación de la vida no es el objetivo principal del tratamiento. Por lo tanto, cobra vital importancia el desarrollo de clínicas de insuficiencia cardiaca, con un equipo de trabajo multidisciplinario que permita lograr adecuadamente este objetivo.

Además se debe hacer énfasis, en el seguimiento clínico basado en escalas de calidad de vida relacionada con la salud. Dado que las estimaciones médicas de los pacientes basadas únicamente en medidas funcionales, pueden subestimar el verdadero impacto de la enfermedad en un paciente

Este estudio permitió conocer la epidemiología y las características de una población Colombiana. Reconociendo que las 3 patologías más frecuentes fueron la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y la fibrilación auricular. Las dos primeras, más frecuentes en la población >65 años, hecho consistente con la literatura. Por lo que se debe hacer énfasis en el tratamiento y seguimiento de dichas enfermedades, las cuales pueden estar relacionadas con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Además, el porcentaje de dilatación de aurícula izquierda fue alto, lo que explicaría la alta prevalencia de fibrilación auricular.

Por otro lado, destacar la importancia de la cardiopatía isquémica como la principal causa de insuficiencia cardíaca en nuestra población, incluso en pacientes jóvenes. En Colombia, según datos del Observatorio Nacional de Salud (6), las enfermedades cardiovasculares lideran todas las causas de mortalidad, y representan 30% de las muertes en el país. La enfermedad cardíaca isquémica es responsable del 46% de éstas. De esta manera se podrían implementar acciones dirigidas al control de factores de riesgo modificables implicados en la enfermedad aterosclerótica.

Con respecto a las fortalezas de este estudio, se destaca que es el primer estudio en Colombia que compara la CVRS entre dos grupos etáreos, además la aplicación de un instrumento como el *Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire* (KCCQ), que valora las dimensiones clásicas de los demás cuestionarios (física, síntomas, social), y también incorpora una valoración de los cambios en los síntomas y del nivel de autocuidado de dichos pacientes.

Adicionalmente, se evaluaron múltiples variables clínicas que permitieron un abordaje integral de toda la muestra, permitiendo realizar un mayor número de asociaciones. De modo complementario, el entorno de la consulta externa permitió una información más fidedigna del estado basal del paciente y la calidad de vida relacionada con la salud.

Esta investigación tiene algunas limitaciones, en primer lugar la naturaleza de un único centro limita potencialmente su capacidad de generalización. Además, se debe tener en cuenta la influencia del fenotipo de IC (fracción de eyección conservada versus reducida), ya que la falta de terapias comprobadas para mejorar los resultados en la insuficiencia cardíaca diastólica puede confundir los resultados. Por otro lado, la naturaleza observacional de este estudio excluye conclusiones sobre causalidad.

Aún permanecen varias incertidumbres, como si el hecho de cambiar el rango de edad, por ejemplo a mayores vs menores de 50 años, hubiera detectado diferencias en calidad de vida relacionada con la salud en los dominios evaluados. Además, si bien hubo un tamaño de muestra adecuado para evaluar diferencias estadísticamente significativas determinadas por la edad. No se tiene la certeza de que el estudio tenga el suficiente poder estadístico para detectar la asociación de otros factores clínicos, con el deterioro de calidad de vida. Por lo tanto, se requiere aumentar las iniciativas de producción de conocimiento en las áreas de incertidumbre planteadas.

8. CONCLUSIÓN

La calidad de vida relacionada con la salud en la población estudiada no está asociada con edad. En general la mayor parte de los pacientes tuvieron una excelente calidad de vida. Los dominios más afectados en todos los grupos de edad fueron: calidad de vida y estabilidad de síntomas. Los 3 predictores clínicos asociados a peor CVRS fueron hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, clase funcional NYHA III-IV y antecedente de accidente cerebrovascular.

La evaluación integral del paciente mediante escalas de calidad de vida, permite explorar los efectos de la IC en la vida diaria, y por lo tanto proporciona información que no puede ser extrapolada de otras mediciones clínicas funcionales. El hecho de no apreciar la verdadera CVRS de los pacientes puede crear una sensación de inutilidad terapéutica.

Es importante, asumir los resultados de este estudio con el compromiso de iniciar un proceso de optimización del tratamiento, e implementar estrategias enfocadas a mejorar la calidad de vida en cada uno de los dominios más afectados. Con el propósito de mejorar desenlaces clínicos basados en el paciente. De ésta forma se dará un verdadero sentido a esta investigación.

Se necesitan investigaciones más detalladas sobre los mediadores de la CVRS para comprender mejor esta relación y buscar factores potencialmente modificables que puedan optimizar la calidad de vida de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca.

ANEXO 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

**NOMBRE DEL PROYECTO: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA:
COMPARACIÓN ENTRE ADULTOS MENORES Y MAYORES DE 50 AÑOS**

Investigadores:

Ángela María Torres Bustamante (Residente de Medicina interna UNAB);

Juan Fernando Carvajal Estupiñán (Médico Internista-Cardiólogo)

1. IDENTIFICACIÓN				
Fecha de inclusión:				
Paciente número:		Cédula:		
Nombre completo:				
Género	Masculino		Femenino	
Edad		Fecha de nacimiento		
EPS		Ocupación		
Procedencia:	Urbana		Rural	
Teléfonos:				
Estrato		Raza		

2. ANTECEDENTES									
Número de consultas en el último año					Fecha de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca				
Fecha de la primera consulta					Fecha de la última consulta				
Tipo de cardiopatía									
Número de hospitalizaciones en el último año por insuficiencia cardíaca					Fecha de inicio de los síntomas				
Hipertensión arterial	Sí		No		DM	Sí		No	
ERC	Sí		No		TFG				
IAM	Sí		No		PCI	Sí		No	
Arritmia cardíaca	Sí		No		¿Cuál?				
Cirugía cardíaca	Sí		No		¿Cuál?				
Dispositivo de estimulación	Sí		No		¿Cuál?				
EAO	Sí		No		EPOC	Sí		No	

Enfermedad respiratoria	Sí		No		¿Cuál?				
Enfermedad musculoesquelética/tejido conectivo	Sí		No		¿Cuál?				
Enfermedad gastrointestinal/hepática	Sí		No		¿Cuál?				
Antecedente de AIT/ACV	Sí		No		¿Cuál?				
Demencia	Sí		No		¿Cuál?				
Infección por VIH	Sí		No		Estadío VIH				
Antecedente de consumo de alcohol	Sí		No		¿Cuánto? (Especifique tipo de bebida y número de copas/latas semanales)				
Antecedente de consumo de cigarrillo	Sí		No		Índice tabáquico				
Cardiopatía familiar	Sí		No		Muerte súbita en familiar joven (En primer grado)	Sí		No	

3. PARACLÍNICOS INICIALES							
Hb		Hcto		Sodio		Potasio	
ASAT		ALAT		Albúmina		CK	
BNP		NT PROBNP		Troponina		Ácido úrico	
Glicemia		HBA1C		IgG chagas		Hierro	
Ferritina		Saturación de transferrina		TSH			

4. VARIABLES ELECTROCARDIOGRÁFICAS (último EKG tomado)									
Ritmo		FC		PR		QRS		QTC	
Conclusión									

5. VARIABLES ECOCARDIOGRÁFICAS (primer ecocardiograma aportado)					
FEVI		DDVI		DSVI	
Septo		PP		Masa	
Espesor relativo		E/e'		Diástole	
TAPSE		DVD		Volumen AI	
Área AI		Tricúspide		Pulmonar	

Aórtica		Mitral		PSAP	
---------	--	--------	--	------	--

6. EXAMEN FÍSICO					
Peso		Talla		IMC	
FC		PAS		PAD	
NYHA		IY		Edemas	
Estertores		S3		Hepatomegalia	

7. MEDICAMENTOS (Según la última consulta)								
BB	Sí		No		¿Cuál?		% Dosis	
IECA	Sí		No		¿Cuál?		% Dosis	
ARA II	Sí		No		¿Cuál?		% Dosis	
ARM	Sí		No		¿Cuál?		% Dosis	
Ivabradina	Sí		No		Digoxina	Sí		No
Diurético	Sí		No		Anticoagulante	Sí		No
Antiagregante	Sí		No		Estatina	Sí		No

9. KANSAS CITY (CUESTIONARIO)	
Dimensión	Puntaje (0-100)
Limitación física (Preguntas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f)	
Frecuencia de síntomas (Preguntas 3,5,7,9)	
Severidad de los síntomas (Preguntas 4,6,8)	
Estabilidad de los síntomas (Pregunta 2)	
Calidad de vida (Preguntas 13,14,15a,15b)	
Autoeficacia (Preguntas 10,11,12)	
Interferencia social (Preguntas 15c, 15d)	
Síntomas totales (Frecuencia de los síntomas y severidad de los síntomas)	
Resumen clínico (Limitación física más síntomas totales)	
Resumen general (Limitación física, síntomas totales, calidad de vida, interferencia social)	
Pobre calidad de vida (0 – 24)	
Calidad de vida regular (25-49)	
Buena calidad de vida (50 – 74)	
Excelente calidad de vida (75-100)	

ANEXO 2. CUESTIONARIO KANSAS CITY

Cuestionario sobre la insuficiencia cardíaca (Kansas City)

Las siguientes preguntas se refieren a la **insuficiencia cardíaca** y cómo puede afectar su vida. Por favor, lea y conteste las siguientes preguntas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Por favor, elija la respuesta que corresponda mejor a su situación.

1. La **insuficiencia cardíaca** afecta a las personas de diferentes maneras. Algunas sienten más la falta de aire mientras que otras sienten más la fatiga. Por favor, indique en qué medida la **insuficiencia cardíaca** (por ejemplo, falta de aire o fatiga) ha limitado su capacidad para realizar las siguientes actividades durante las últimas 2 semanas.

Por favor, marque con una **X** un cuadrito en cada línea

Actividad	Extremadamente limitado/a	Bastante limitado/a	Moderadamente limitado/a	Ligeramente limitado/a	Nada limitado/a	Limitado/a por otras razones o no realicé esta actividad
Vestirse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ducharse/bañarse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caminar una cuadra en terreno plano	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arreglar el jardín, hacer tareas domésticas o cargar las compras	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Subir un piso por las escaleras sin detenerse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Correr o apresurarse (como para alcanzar el autobús)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2. En comparación con hace 2 semanas, ¿han cambiado sus síntomas de **insuficiencia cardíaca** (por ejemplo, falta de aire, fatiga o hinchazón de los tobillos)?

Mis síntomas de **insuficiencia cardíaca** están...

Mucho peor	Algo peor	Sin cambios	Algo mejor	Mucho mejor	No tuve síntomas durante las últimas 2 semanas
☐	☐	☐	☐	☐	☐

8. Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tanto le ha molestado la **falta de aire**?

La falta de aire ha sido...

Extremada- mente molesta	Bastante molesta	Moderada- mente molesta	Ligeramente molesta	Nada molesta	No he tenido falta de aire
☐	☐	☐	☐	☐	☐

9. Durante las últimas 2 semanas, en promedio, ¿cuántas veces se ha visto obligado/a a dormir sentado/a en un sillón o apoyado/a en por lo menos 3 almohadas al sentir que le **falta el aire**?

Todas las noches	3 o más veces por semana pero no todas las noches	1-2 veces por semana	Menos de una vez por semana	Nunca en las últimas 2 semanas
☐	☐	☐	☐	☐

10. Los síntomas de **insuficiencia cardíaca** pueden empeorar por varias razones. ¿Qué tan seguro/a está de lo que debe hacer o a quién llamar si sus síntomas de **insuficiencia cardíaca** empeoran?

Nada seguro/a	No muy seguro/a	Algo seguro/a	Bastante seguro/a	Completamente seguro/a
☐	☐	☐	☐	☐

11. ¿Entiende bien lo que puede hacer para evitar que sus síntomas de **insuficiencia cardíaca** empeoren (por ejemplo, pesarse regularmente, seguir una dieta baja en sal, etc.)?

No entiendo nada	No entiendo muy bien	Entiendo algo	Entiendo bastante	Entiendo perfectamente
☐	☐	☐	☐	☐

12. Durante las últimas 2 semanas, ¿en qué medida la **insuficiencia cardíaca** ha limitado su capacidad para disfrutar de la vida?

Extremadamente	Bastante	Moderadamente	Ligeramente	Para nada
☐	☐	☐	☐	☐

13. Si tuviera que vivir el resto de su vida con **insuficiencia cardíaca** tal como la padece en este momento, ¿cómo se sentiría al respecto?

Completamente insatisfecho/a ☐ Bastante insatisfecho/a ☐ Algo satisfecho/a ☐ Bastante satisfecho/a ☐ Completamente satisfecho/a ☐

14. Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido desanimado/a o deprimido/a debido a la **insuficiencia cardíaca**?

Me he sentido así todo el tiempo ☐ Me he sentido así la mayoría del tiempo ☐ Me he sentido así a veces ☐ Casi nunca me he sentido así ☐ Nunca me he sentido así ☐

15. ¿Qué tanto afecta la **insuficiencia cardíaca** su estilo de vida? Por favor, indique en qué medida la **insuficiencia cardíaca** puede haber limitado su participación en las siguientes actividades durante las últimas 2 semanas.

Por favor, marque con una X un cuadrito en cada línea

Actividad	Extremadamente limitado/a	Bastante limitado/a	Moderadamente limitado/a	Ligeramente limitado/a	Nada limitado/a	Limitado/a por otras razones o no realicé esta actividad
Pasatiempos, actividades recreativas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Trabajar o hacer tareas de la casa en general	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ir a visitar a familiares o amigos	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Relaciones íntimas o sexuales	☐	☐	☐	☐	☐	☐

BIBLIOGRAFÍA

1. Savarese G, Lund LH. Global Public Health Burden of Heart Failure. *Card Fail Rev.* 2017;1:7–11.
2. Bakitas MA, Dns C, Arnold RM. Palliative Care in Heart Failure. *J Am Coll Cardiol.* 2017;70(15).
3. Liu L. Epidemiology of heart failure and scope of the problem. *Cardiol clin.* 2014;32:1–8.
4. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, De Simone G, Ferguson TB, Flegal K, et al. Heart disease and stroke statistics--2009 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. *Circulation.* 2009;
5. Masoudi FA, Rumsfeld JS, Havranek EP, House JA, Peterson ED, Krumholz HM, et al. Age, functional capacity, and health-related quality of life in patients with heart failure. *J Card Fail.* 2004;
6. Instituto Nacional de Salud ON de S. Quinto Informe ONS: carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidad en Colombia. *Imprenta Nac Colomb.* 2015;1–212.
7. Introducción C. Introducción, epidemiología de la falla cardiaca e historia de las clínicas de falla cardiaca en Colombia. *Rev Colomb Cardiol [Internet].* 2016;23:6–12. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2016.01.004>
8. Komajda M, Follath F, Swedberg K, Cleland J, Aguilar JC, Cohen-Solal A, et al. The EuroHeart Failure survey programme - A survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Part 2: Treatment. *Eur Heart J.* 2003;
9. Moreno SG, Novielli N, Cooper NJ. Cost-effectiveness of the implantable HeartMate II left ventricular assist device for patients awaiting heart transplantation. *J Hear Lung Transplant.* 2012;
10. Macdonald MR. Heart Failure With Preserved Ejection Fraction in the Young.

Circulation. 2018;138:2763–73.

11. Loisanse DY. Quality of life in advanced chronic heart failure : a relevant or a misleading parameter ? Eur J cardio-thoracic Surg. 2016;1:1–2.
12. Ponikowski P, Voors A. 2016 Esc guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European society of cardiology (ESC): Developed with the special contribution . Russian Journal of Cardiology. 2017.
13. Anand IS, Fisher LD, Chiang Y, Latini R, Masson S, Aldo P, et al. Changes in Brain Natriuretic Peptide and Norepinephrine. Circulation. 2003;107:1278–83.
14. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Colvin MM, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of Amer. J Card Fail. 2017;
15. Mosterd A, Hoes AW. Clinical epidemiology of heart failure. Heart. 2007.
16. Tendera M, Wojakowski W. Epidemiology of diastolic heart failure. In: Diastolic Heart Failure. 2008.
17. Ho KKL, Pinsky JL, Kannel WB, Levy D. The epidemiology of heart failure: The Framingham Study. J Am Coll Cardiol. 1993;
18. Jaramillo C, Gómez E, Hernández E, Saldarriaga C, Flórez N, Buitrago R, et al. Consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Crónica. EMC - Tratado de Medicina. 2013.
19. Levy D, Kenchaiah S, Larson MG, Benjamin EJ, Kupka MJ, Ho KKL, et al. Long-Term Trends in the Incidence of and Survival with Heart Failure. N Engl J Med. 2002;
20. Roger VL, Weston SA, Redfield MM, Hellermann-Homan JP, Killian J, Yawn BP, et al. Trends in heart failure incidence and survival in a community-based population.

- J Am Med Assoc. 2004;
21. Barker WH, Mullooly JP, Getchell W. Changing incidence and survival for heart failure in a well-defined older population, 1970-1974 and 1990-1994. *Circulation*. 2006;
 22. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP, Beiser A, D'Agostino RB, Kannel WB, et al. Lifetime risk for developing congestive heart failure: The Framingham Heart Study. *Circulation*. 2002;
 23. Bibbins-Domingo K, Pletcher MJ, Lin F, Vittinghoff E, Gardin JM, Arynchyn A, et al. Racial Differences in Incident Heart Failure among Young Adults. *N Engl J Med*. 2009;
 24. Wong CM, Hawkins NM, Jhund PS, MacDonald MR, Solomon SD, Granger CB, et al. Clinical Characteristics and Outcomes of Young and Very Young Adults With Heart Failure. *J Am Coll Cardiol*. 2013;
 25. Tanai E, Frantz S. Pathophysiology of heart failure. *Compr Physiol*. 2016;
 26. Kemp CD, Conte J V. The pathophysiology of heart failure. *Cardiovascular Pathology*. 2012.
 27. Braunwald E. Heart failure. *JACC: Heart Failure*. 2013.
 28. Kannel WB, Ho K, Thom T, Israel B. Changing epidemiological features of cardiac failure. *Br Hear J*. 1994;72:3–9.
 29. He J, Ogden LG, Bazzano LA, Vupputuri S, Loria C, Whelton PK. Risk Factors for Congestive Heart Failure in US Men and Women. *ARCH INTERN MED*. 2015;161.
 30. Survivalpatients UC, Initially W, Cardiomyopathy U. Underlying causes and long-term survival in patients with initially unexplained cardiomyopathy. *N Engl J Med*. 2000;342:1077–84.
 31. Cleland JGF, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle N, Gras D, Kappenberger L, et al. Baseline characteristics of patients recruited into the CARE-HF study. *Eur J Heart Fail*. 2005;

32. Ghaemian A, Mohammadpour RA, Hosseini SH, Emadi SH. Depression in heart failure patients and the influence of age, gender and severity of depression on heart failure patients. *J Tehran Univ Hear Cent*. 2007;
33. Hoekstra T, Jaarsma T, Veldhuisen DJ Van, Hillege HL, Sanderman R, Lesman-leegte I. Quality of life and survival in patients with heart failure. *Eur J Heart Fail*. 2013;15:94–102.
34. Torrens A, Enjuanes C, Gonza G, Ribas N, Ruiz S, Go M, et al. Iron deficiency is a key determinant of health- related quality of life in patients with chronic heart failure regardless of anaemia status. *Eur J Heart Fail*. 2013;15:1164–72.
35. Sitlinger A. Health Related Q uality of Life The impact on Morbidity and Mortality. *Surg Oncol Clin NA* [Internet]. 2018;4:675–84. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.soc.2018.05.008>
36. Vader JM. Comparison of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire and Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire in Predicting Heart Failure Outcomes. *Am J Cardiol*. 2020;123(5):807–12.
37. Green CP, Porter CB, Bresnahan DR, Spertus JA. Development and evaluation of the Kansas City cardiomyopathy questionnaire: A new health status measure for heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2000;
38. Vercauteren S, Sawadogo K, Castadot M, Vanhalewyn M, Col J, Robert A. Interaction between the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire and the Pocock ' s clinical score in predicting heart failure outcomes. *Qual Life Res*. 2016;25:1245–55.
39. Comín-Colet J, Garin O, Lupón J, Manito N, Crespo-Leiro MG, Gómez-Bueno M, et al. Validación de la versión española del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. *Rev Esp Cardiol*. 2011;
40. Chan PS, Soto G, Jones PG, Nallamothu BK, Zhang Z, Weintraub WS, et al. Patient Health Status and Costs in Heart Failure Insights From the Eplerenone Post – Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS

-). Circulation. 2015;119.
41. Butler J, Khan MS, Mori C, Filippatos GS, Ponikowski P, Comin-colet J, et al. Minimal clinically important difference in quality of life scores for patients with heart failure and reduced ejection fraction. Eoruepan J Hear Fail. 2020;1–7.
 42. Khush KK, Tasissa G, Butler J, Mcglothlin D. Effect of pulmonary hypertension on clinical outcomes in advanced heart failure : Analysis of the Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness (ESCAPE) database. Am Heart J [Internet]. 157(6):1026–34. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2009.02.022>
 43. Weston SA, Redfield MM, Jacobsen SJ, Meverden RA, Roger VL. Systolic and Diastolic Heart Failure in the Community. JAMA. 2006;296(18):2209–16.